
● **Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas**

RIESGO DE OSTEOPOROSIS ASOCIADO CON LOS INHIBIDORES DE LA AROMATASA

A. 19.10.

Fundamentación: El índice de fracturas por cada 1 000 mujeres sanas de es 19.10.

COMPARACION HISTOMORFOMETRICA DE LOS EFECTOS DEL ALENDRONATO Y LA TERIPARATIDA

D. La teriparatida estimula la estimula osteoblástica.

Fundamentación: La teriparatida incrementa la masa ósea con estimulación preferencial de la formación sobre la reabsorción del hueso.

EFFECTOS POSITIVOS DE DOSIS ULTRABAJAS DE ESTRADIOL SIN OPOSICION EN LA POSMENOPAUSIA

C. Podría utilizarse como tratamiento prolongado sin oposición.

Fundamentación: Su aparente falta de estímulo endometrial sugiere que sería aceptable como tratamiento prolongado y podría ser utilizado sin oposición.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS DURANTE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

D. Todas son correctas.

Fundamentación: Los factores de riesgo para una baja densidad mineral ósea son el sexo femenino, la edad avanzada, el déficit de estrógenos, etcétera.
