

Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Artículos originales y distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura atenta del trabajo, se indica en el sector Respuestas Correctas, acompañada del fundamento escrito por el especialista que elaboró la pregunta.

TD N°	Enunciados	Seleccione sus opciones
1	¿Cómo fue la sensibilidad de la PCR frente al cultivo para el diagnóstico de la enfermedad meningocócica en casos fulminantes?	A) La PCR fue superior al cultivo. B) El cultivo fue más sensible que la PCR. C) Las diferencias no fueron significativas. D) Ninguno de los métodos fue de utilidad.
2	Las mediciones de las limitaciones funcionales o de la discapacidad secundaria al dolor crónico en niños y adolescentes:	A) Son importantes ya que todos los niños con dolor crónico presentan impedimentos funcionales. B) Se encuentran ampliamente disponibles y no requieren desarrollo o validación adicionales. C) Deben ser validadas debido a que la mejoría en el funcionamiento es importante. D) Proporcionan la misma información que la medición de la intensidad del dolor.
3	¿Cuál fue la incidencia de reflujo gastroesofágico en los recién nacidos pretérmino < 34 semanas de edad gestacional?	A) Aproximadamente del 10%. B) Alrededor del 5%. C) Cercana al 30%. D) Alrededor del 25%.
4	¿Cuántos niños mueren por año en Inglaterra y el País de Gales por accidentes de tránsito?	A) 43. B) 170. C) 700. D) 80.
5	¿Qué rendimiento cognitivo y motor mostraron vs. un grupo control los adolescentes con antecedentes de deficiencia de hierro en la primera infancia?	A) Similar. B) Menor, no significativo. C) Menor, significativo. D) Mayor, no significativo.
6	¿Qué tipo de laxantes son los más indicados para la terapia de mantenimiento en la constipación?	A) Laxantes estimulantes. B) Laxantes osmóticos. C) Laxantes estimulantes y osmóticos. D) Supositorios y enemas.
7	¿Cuál es la estrategia terapéutica preferida de prevención secundaria en fiebre reumática?	A) Inyecciones regulares de penicilina. B) Macrólidos por vía oral. C) Cefalosporinas por vía oral. D) No existe ninguna medida realmente eficaz.
8	¿Cuál es el mayor nivel de información experimental que avala la utilidad de juego terapéutico como psicoprofilaxis quirúrgica?	A) Estudios observacionales. B) Estudios de casos y controles. C) Estudios controlados aleatorizados a simple ciego. D) Estudios controlados aleatorizados a doble ciego.
9	¿Qué modelo de costo-efectividad es el más económico en el tratamiento de la otitis media aguda?	A) Conducta expectante. B) Prescripción tardía. C) Tratamiento con amoxicilina durante 5 días. D) Tratamiento con amoxicilina durante 7 a 10 días.

Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas	Fundamentaciones	Opción
1	La PCR fue superior al cultivo.	Es de destacar el incremento significativo de la sensibilidad de la PCR frente al cultivo en las formas fulminantes de la enfermedad.	A
2	Deben ser validadas debido a que la mejoría en el funcionamiento es importante.	Las mediciones de las limitaciones funcionales no se encuentran ampliamente disponibles y requieren perfeccionamiento y validación adicionales.	C
3	Alrededor del 25%.	La incidencia estimada de reflujo gastroesofágico en este grupo de edad fue del 22%.	D
4	170.	Según estadísticas oficiales del Reino Unido, aproximadamente 170 niños mueren cada año en Inglaterra y el País de Gales debido a accidentes de tránsito.	B
5	Menor, significativo.	Tuvieron un menor rendimiento significativo en aritmética y escritura, el funcionamiento motor y algunos procesos cognitivos específicos y una tendencia para lectura más de 10 años después del tratamiento para la deficiencia de hierro.	C
6	Laxantes osmóticos.	La mejor evidencia en cuanto a efectividad la tienen los laxantes osmóticos y, entre éstos, el polietilenglicol tiene menos probabilidad de producir efectos adversos.	B
7	Inyecciones regulares de penicilina.	La aplicación de penicilina IM cada 3 o 4 semanas representa la mejor forma de prevenir la enfermedad cardíaca crónica en pacientes que presentaron fiebre reumática aguda.	A
8	Estudios controlados aleatorizados a simple ciego.	Existe información experimental por un ensayo clínico controlado, aleatorizado y a simple ciego que apoya la efectividad del uso del juego terapéutico como intervención y la importancia de la participación de los padres en la psicoprofilaxis quirúrgica de los niños.	C
9	Prescripción tardía.	La prescripción tardía, la opción más económica, no solo ahorra de manera considerable los costos industriales de servicios de salud, sino que promoverá la «desmedicalización» de una infección de vías aéreas superiores autolimitada y disminuirá la resistencia antibiótica.	B