

# Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Artículos originales y distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura atenta del trabajo, se indica en el sector Respuestas Correctas, acompañada del fundamento escrito por el especialista que elaboró la pregunta.

TD N°	Enunciados	Seleccione sus opciones
1	La mayor gravedad de la hipoacusia resulta en aumento de la correlación entre los umbrales según los PE Aee y aquellos conductuales debido principalmente a:	A) Modulación de las frecuencias entre 70 Hz y 110 Hz. B) Reclutamiento fisiológico. C) Respuestas falsas. D) Técnicas de determinación objetiva del umbral auditivo.
2	¿Cuánto dura la protección con fracción entera de <i>Bordetella pertussis</i> (Pe) y <i>B. pertussis</i> acelular (Pa)?	A) Entre 4 y 14 años para Pa y entre 5 y 6 años para Pe. B) Entre 4 y 14 años para ambas. C) Entre 5 y 6 años para ambas. D) Entre 4 y 14 años para Pe y entre 5 y 6 años para Pa.
3	¿Cuál es la causa más frecuente de estridor en niños menores de 2 años?	A) Laringotraqueobronquitis. B) Epiglotitis. C) Absceso retrofaríngeo. D) Laringomalacia.
4	Señale la opción correcta en cuanto a la relación entre la depresión materna y la enfermedad diarreica infantil:	A) Los hijos de madres con depresión posparto tienen más episodios anuales de diarrea. B) La asociación entre la depresión materna y la diarrea infantil se debe a la desnutrición. C) La asociación entre la depresión materna y la diarrea infantil se debe al bajo nivel socioeconómico. D) Es causada por la educación inadecuada de los padres.
5	¿En cuáles de las siguientes circunstancias es aconsejable indicar tratamiento con fármacos antiepilépticos después de la primera crisis?	A) En los niños, independientemente que las crisis sean febriles o no. B) En todos los pacientes que presentan un accidente cerebrovascular agudo. C) Hay lesión neurológica previa, antecedentes familiares o el electroencefalograma muestra alteraciones. D) Cuando la crisis mostró comienzo parcial.
6	Los niños que fueron expuestos al olor de la leche de su madre mostraron:	A) Rondas más largas de movimientos repetitivos de succión. B) Mayor cantidad de rondas prolongadas (7 o más movimientos de succión). C) Más consumo de leche y menor tiempo de permanencia en el hospital. D) Todas son correctas.
7	¿Cuál es el mejor tratamiento para los trastornos otorrinolaringológicos asociados con enfermedad por reflujo extraesofágico?	A) Terapia supresora del ácido, cambios alimentarios y en el estilo de vida. B) Terapia supresora del ácido. C) Cambios alimentarios y en el estilo de vida. D) Cirugía.
8	Cuáles de las siguientes opciones explican la asociación entre sobrepeso y reflujo gastroesofágico?	A) Prevalencia incrementada de hernia hiatal y aumento de la presión intraabdominal. B) Aumento de la sensibilidad esofágica al ácido. C) Aumento de secreción de bilis y de enzimas pancreáticas. D) Todas son correctas.
9	¿Cuál es el efecto del suplemento de calcio durante el embarazo sobre la presión arterial en los niños mayores de 1 año?	A) Disminución de la presión arterial sistólica. B) Disminución de la presión arterial diastólica. C) Aumento de la presión arterial sistólica. D) Aumento de la presión arterial diastólica.

## Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas	Fundamentaciones	Opción
1	Reclutamiento fisiológico.	Diversos informes señalan que los umbrales de los PE Aee en los sujetos con audición normal son más altos, comparados con los de quienes padecen hipoacusia, debido al reclutamiento fisiológico en este último caso.	B
2	Entre 4 y 14 años para Pe y entre 5 y 6 años para Pa.	Las estimaciones de la duración de la protección después de la vacunación con fracción entera de <i>Bordetella pertussis</i> oscilan entre 4 y 14 años y luego de la vacunación con <i>B. pertussis</i> acelular, aproximadamente 5 a 6 años.	D
3	Laringotraqueobronquitis.	La laringotraqueobronquitis es la causa más común de estridor en pacientes menores de 2 años. El agente causal más frecuente es el virus parainfluenza, aunque también pueden provocarla el rinovirus, el virus sincitial respiratorio y los virus influenza tipo A y B.	A
4	Los hijos de madres con depresión posparto tienen más episodios anuales de diarrea.	Los hijos de madres con depresión posparto tienen más episodios anuales de diarrea en comparación con los hijos de madres psicológicamente estables. Esta asociación es independiente de la desnutrición, el nivel socioeconómico y la educación de los padres.	A
5	Hay lesión neurológica previa, antecedentes familiares o el electroencefalograma muestra alteraciones.	En general, el riesgo de recurrencia de las crisis epilépticas se encuentra aumentado en los individuos con antecedentes de alguna lesión previa, hallazgos anormales en el electroencefalograma o historia familiar de epilepsia. En los niños, las crisis subsiguientes	C
6	Todas son correctas.	Estos niños mostraron rondas más largas de movimientos de succión, mayor cantidad de rondas prolongadas y consumieron más leche que los niños expuestos al olor del agua. Además, permanecieron en el hospital menos tiempo.	D
7	Terapia supresora del ácido, cambios alimentarios y en el estilo de vida.	La terapia supresora del ácido, junto con los cambios alimentarios y en el estilo de vida se utilizan para tratar los trastornos otorrinolaringológicos asociados con enfermedad por reflujo extraesofágico.	A
8	Todas son correctas.	El sobrepeso puede generar reflujo gastroesofágico mediante diversos mecanismos: puede estar involucrada la mayor prevalencia de hernia hiatal y aumento de la presión intraabdominal, lo que favorece el reflujo y la exposición esofágica prolongada al ácido. En un metanálisis que combinó los resultados de 4 estudios encontró una reducción de la presión arterial sistólica media en los hijos de las madres que recibieron suplementos de calcio durante el embarazo.	D
9	Disminución de la presión arterial sistólica.	Un metanálisis que combinó los resultados de 4 estudios encontró una reducción de la presión arterial sistólica media en los hijos de las madres que recibieron suplementos de calcio durante el embarazo.	A