

# Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Artículos originales y distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura atenta del trabajo, se indica en el sector Respuestas Correctas, acompañada del fundamento escrito por el especialista que elaboró la pregunta.

TD N°	Enunciados	Seleccione sus opciones
1	Señale la respuesta correcta en relación a la nefropatía asociada al VIH-1	A) No se caracteriza por la presencia de proteinuria importante. B) Excepcionalmente progresa hasta la enfermedad renal terminal. C) La infección por VIH-1 parece desempeñar un papel clave en la patogenia D) Ninguna es correcta
2	¿Cuál es la mejor opción terapéutica para las náuseas y los vómitos posoperatorios en los niños con riesgo moderado a alto?	A) Los antagonistas de los receptores de 5-HT3 solos. B) Los antagonistas de los receptores de 5-HT3 en combinación con dexametasona. C) El droperidol solo o en combinación. D) La dexametasona sola.
3	Señale la opción correcta acerca del trastorno por estrés postraumático (TEPT) en la población pediátrica.	A) Presenta de síntomas de reexperimentación y evitación de circunstancias relacionadas con el trauma. B) Es importante asesorar a los padres sobre la posibilidad de surgimiento de síntomas. C) En la actualidad, el tratamiento de elección es la terapia cognitivo conductual centrada en el trauma. D) Todas las opciones son correctas.
4	Señale la opción correcta en cuanto al diagnóstico de trastorno bipolar de tipo II (TBP-II) y trastorno depresivo mayor (TDM) en los niños.	A) El diagnóstico de TBP-II es frecuentemente confundido con el de TDM. B) La utilización de entrevistas semiestructuradas no es útil para diagnosticar bipolaridad. C) El diagnóstico de TDM es frecuentemente confundido con el de TBP-II. D) En el diagnóstico de TBP-II siempre se emplean entrevistas semiestructuradas en la práctica clínica.
5	¿Cómo resultó la incidencia y gravedad de la osteoporosis durante la menopausia en las mujeres con amenorrea secundaria durante la adolescencia en comparación con aquellas con ciclos menstruales regulares?	A) Similar. B) Menor, no significativa. C) Mayor, no significativa. D) Mayor, significativa.
6	¿Cuál es el tratamiento de elección para las regurgitaciones del lactante sin otra sintomatología?	A) Fórmulas antirreflujo espesadas con almidón de maíz hidrolizado. B) Supresores del ácido. C) Proquinéticos. D) Ninguno.
7	Señale cuál de las condiciones que se enumeran a continuación induce a los adolescentes a iniciarse en el hábito de fumar.	A) Buen desempeño escolar. B) Tener una familia biparental. C) Participar en actividades físicas y deportivas. D) Tener padre o madre fumador.
8	¿Qué porcentaje de las drogas para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico carecen de presentaciones correctamente diseñadas para la población pediátrica?	A) Aproximadamente un 50%. B) Aproximadamente un 20%. C) Aproximadamente un 10%. D) Aproximadamente un 40%.

## Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas	Fundamentaciones	Opción
1	La infección por VIH-1 parece desempeñar un papel clave en la patogenia.	La infección por VIH-1 desempeñaría un papel clave en la patogenia de la nefropatía asociada con el VIH, al afectar el crecimiento y diferenciación de las células epiteliales renales y aumentar el reclutamiento de las células inflamatorias y los factores de crecimiento circunferentes que fijan la heparina.	C
2	Los antagonistas de los receptores de 5-HT3 en combinación con dexametasona.	El mejor esquema de profilaxis para las náuseas y los vómitos posoperatorios en niños con riesgo moderado a alto se logró con la combinación de dexametasona y un antagonista del receptor 5-HT3 como ondansetrón, dolasetrón, granisetrón y tropisetrón.	B
3	Todas las opciones son correctas.	El TEPT consiste en síntomas de reexperimentación, evitación de circunstancias relacionadas con el trauma e hiperactivación. Es importante asesorar a los padres sobre la posibilidad de surgimiento de síntomas y sobre la consulta si éstos duran más de 1 mes. El tratamiento de elección es la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma.	D
4	El diagnóstico de TBP-II es frecuentemente confundido con el de TDM.	En los niños, el diagnóstico de TBP-II es frecuentemente confundido con el de TDM. La semiestructuradas en la práctica clínica.	A
5	Mayor, significativa.	La osteoporosis fue significativamente más frecuente y más grave en las mujeres con amenorrea secundaria durante la adolescencia en comparación con aquellas con ciclos menstruales regulares.	D
6	Ninguno.	Las regurgitaciones del lactante sin otra sintomatología no requieren tratamiento. El pediatra debe asegurar a los padres que el niño no necesita exámenes complementarios y que es probable que los síntomas disminuyan o desaparezcan hacia los 12-18 meses.	D
7	Tener padre o madre fumador.	El tener un allegado fumador, familiar o conviviente, es el factor más importante que induce a los adolescentes a iniciarse en el hábito de fumar.	D
8	Aproximadamente un 20%.	El 19% de las drogas para la enfermedad por reflujo gastroesofágico carecen de presentaciones correctamente diseñadas para la población pediátrica, aunque son utilizables en este grupo de edad. Este porcentaje corresponde a los antagonistas de los receptores H2 y los inhibidores de la bomba de protones, específicamente ranitidina, omeprazol y lansoprazol.	B