
● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis en los Niños

C. 6 meses con H.

Fundamentación: Para el tratamiento de la infección tuberculosa, los cursos cortos con H por 6 a 9 meses son tan efectivos como los regímenes de 12 meses. En el Reino Unido, se recomienda H por 6 meses.

DISTIMIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

A. Inhibidores de la recaptación de serotonina.

Fundamentación: Los inhibidores de la recaptación de serotonina constituyen el tratamiento farmacológico de primera elección en los niños y adolescentes con distimia debido a su seguridad, eficacia, facilidad de empleo y perfil de efectos adversos.

TRATAMIENTO DE LA CONSTIPACION EN LOS NIÑOS

B. = Retiene agua osmóticamente en el colon y favorece el crecimiento de bacterias colónicas.

Fundamentación: La lactulosa tiene una función mixta ya que retiene agua osmóticamente en el colon y favorece el crecimiento de las bacterias colónicas.

ANALIZAN CARACTERISTICAS CLINICAS DE PACIENTES PEDIATRICOS CON MENINGITIS BACTERIANA E INFARTO CEREBRAL

B. = Hidrocefalia.

Fundamentación: La hidrocefalia está asociada con el infarto cerebral en pacientes pediátricos con meningitis bacteriana.
