



Colección
Trabajos Distinguidos
Serie
Pediatría

Volumen 8, Número5, Marzo 2005

● **Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas**

DESCRIBEN RELACION ENTRE RECUESTO DE MACROFAGOS URINARIOS Y NEFROPATIA POR IgA EN LA INFANCIA

D. Mayor, significativo.

Fundamentación: El número de macrófagos en la orina de los niños con nefropatía por IgA fue significativamente más alto en comparación con los sanos.

DESTACAN LA FALTA DE ADECUACION EN DISTINTOS MEDICAMENTOS PARA NIÑOS HOSPITALIZADOS

A. 6 años.

Fundamentación: No se recomienda administrar medicaciones en formas orales sólidas antes de los 6 años de edad.

METFORMINA VERSUS INSULINA EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 2 EN ADOLESCENTES

D. Peor, significativo.

Fundamentación: Hubo un deterioro significativo en el control glucémico con el cambio de tratamiento (HbA_{1C} $5 \pm 2.6\%$ con insulina a HbA_{1C} $8.4 \pm 2.9\%$ con metformina, $p < 0.05$).

RESEÑA ACERCA DE LA REANIMACION DE RECIEN NACIDOS PREMATUROS

D. Cuando el niño no está rosado ni activo al momento del nacimiento.

Fundamentación: No todos los neonatos de menos de 28 semanas de gestación requieren intubación endotraqueal al momento del nacimiento, pero ésta debe considerarse si el niño no está rosado ni activo.

Trabajos Distinguidos, Pediatría , integra el Programa SIIC de Educación Médica Continuada