
● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

UTILIDAD DE EXAMENES BIOLÓGICOS Y TRATAMIENTOS EN INFECCIONES RESPIRATORIAS RECIDIVANTES

C. Entre los 18 meses y los 3 años.

Fundamentación: Los estudios epidemiológicos demuestran que el pico de mayor frecuencia de las rinofaringitis recidivantes se encuentra entre los 6 y los 18 meses de edad.

FACTORES PREDICTIVOS DEL CONTENIDO MINERAL ÓSEO EN EL RECIÉN NACIDO

D. Las concentraciones de VD en el lactante, el peso y la edad gestacional.

Fundamentación: Las concentraciones de vitamina D en el lactante se asocian positivamente con el contenido mineral óseo del recién nacido. Por este motivo, en los recién nacidos de mayor tamaño el contenido mineral óseo podría ser mayor si presentaran valores de vitamina D adecuados.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD GESTACIONAL DE LA DISCORDANCIA DEL PESO DE NACIMIENTO EN GEMELOS

A. 28

Fundamentación: A las 28 semanas de gestación es mayor la diferencia de peso entre gemelos.

RELACION ENTRE EXPOSICIÓN A LA TELEVISIÓN Y CONSUMO DE ANALGÉSICOS EN ADOLESCENTES

A. Adolescentes de sexo femenino.

Fundamentación: Las adolescentes de sexo femenino presentan mayores probabilidades de convertirse en consumidoras regulares de analgésicos de venta libre, fenómeno posiblemente asociado con las molestias menstruales.
