

---

## ● **Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas**

---

### **ASOCIACION ENTRE DIETA Y MOMENTO DE APARICION DE LA ENFERMEDAD CELIACA**

**A.** Diabetes tipo 2.

**Fundamentación:** La mayoría de los pacientes con enfermedad celíaca son portadores de los alelos de histocompatibilidad HLA-DRB1\*03 o HLA-DRB1\*04 que también confieren mayor riesgo de aparición de diabetes tipo 1.

---

### **USO DE DROGAS ANTIDEPRESIVAS Y AGENTES ESTABILIZADORES DEL HUMOR EN JOVENES**

**C.** Aumento, significativo.

**Fundamentación:** El uso de ISRS aumentó de 4.6 por 1 000 pacientes en 1994 a 14.5 por 1 000 en 2003 ( $p < 0.0001$ ).

---

### **FARMACOTERAPIA EN EL TRASTORNO BIPOLAR JUVENIL**

**B.** Un agente estabilizador del humor.

**Fundamentación:** En caso de trastorno bipolar juvenil tipos I o II se sugiere comenzar el tratamiento con un agente estabilizador del humor; la primera elección recae sobre el litio o el valproato de sodio.

---

### **INTOLERANCIA A LA GLUCOSA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES OBESOS DE RAZA BLANCA**

**B.** El II, la RI, la presión arterial diastólica.

**Fundamentación:** El II, la RI y la presión arterial diastólica se asociaron significativa e independientemente con los valores de glucemia a las 2 horas de la PTGO.

---

### **CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LA LECHE MATERNA Y LAS FORMULAS LACTEAS**

**B.** Mayor, significativa.

**Fundamentación:** Los productos de peroxidación lipídica fueron mucho más elevados en la leche materna en comparación con las fórmulas lácteas.

---