
Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS CON TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD

A. Las actividades usuales.

Fundamentación: La mayoría de los padres informaron al menos algún problema con las actividades usuales.

COMPARAN MIDAZOLAM ORAL CON DIAZEPAM RECTAL EN LAS CONVULSIONES INFANTILES

D. Mayor, significativa.

Fundamentación: En este grupo de pacientes, el midazolam oral fue más efectivo que el diazepam rectal ($p < 0.001$).

CARACTERISTICAS CLINICAS, AMBIENTALES Y TERAPEUTICAS DE LA GIARDOSIS EN NIÑOS

D. La transmisión es fecal-oral

Fundamentación: La transmisión es fecal-oral, por contacto con personas o con animales infectados, o por el consumo de agua o de alimentos contaminados con quistes.

LA MIGRAÑA ES LA CEFALEA PRIMARIA MAS FRECUENTE EN LA INFANCIA

A. 5% y 10%

Fundamentación: La migraña es la cefalea primaria más frecuente en la infancia y su prevalencia oscila entre el 5% y el 10%.

COMPARAN DOS TRATAMIENTOS ANTIBIOTICOS PARA LA NEUMONIA EXTRAHOSPITALARIA COMPLICADA EN NIÑOS

B. Similar.

Fundamentación: En niños con neumonía extrahospitalaria complicada, el tratamiento con amoxicilina/sulbactam produjo resultados terapéuticos satisfactorios y similares a los obtenidos con cefuroxima (tasas de éxito del 97% y 100%, respectivamente).
