
Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

ATENCIÓN INTEGRAL PARA MADRES DE NIÑOS CON DIARREA E INFECCIÓN RESPIRATORIA

C. Mejoría, significativa.

Fundamentación: Al comparar la consulta inicial con la segunda (6 meses después de la intervención) se observaron beneficios significativos después de la intervención, con sostenimiento de los resultados hasta el año de la aplicación de la estrategia de atención integrada.

ACTUALIZAN FISIOPATOLOGÍA DE LA ANOREXIA NERVIOSA RESTRICTIVA

D. No se hallaron diferencias en los niveles plasmáticos de cortisol, DHEA y DHEA-S en las pacientes adolescentes con anorexia nerviosa y bajo peso con respecto a las voluntarias sanas.

Fundamentación: No se hallaron diferencias en los niveles plasmáticos de cortisol, deshidroepiandrosterona (DHEA) y el sulfato de DHEA (DHEA-S) en las pacientes adolescentes con anorexia nerviosa (AN) y bajo peso con respecto a las voluntarias sanas. Se halló un índice cortisol/DHEA-S significativamente menor. Las variaciones en la actividad de los neuroesteroides (NE) y del cortisol serían relevantes en las alteraciones de la ingesta presentes en la AN. En cambio, no se halló relación entre las características psicopatológicas y las alteraciones de los NE.

AVANCES EN EL ESTUDIO DE LA DEPRESIÓN EN LA ADOLESCENCIA

B. Las mujeres presentaron con mayor probabilidad culpabilidad excesiva, aumento del apetito y disconformidad con su propio aspecto. En cambio, los varones mostraron más frecuentemente anhedonia, fatiga matutina e irritabilidad.

Fundamentación: Las mujeres presentaron con mayor probabilidad culpabilidad excesiva, aumento del apetito y disconformidad con su propio aspecto. En cambio, los varones mostraron más frecuentemente anhedonia, fatiga matutina e irritabilidad.

LA SUSPENSIÓN DE CEFDINIR EN COMPARACIÓN CON OTROS ANTIBIÓTICOS SEGÚN LOS NIÑOS

D. Mejor, significativo.

Fundamentación: Según los resultados combinados de 7 ensayos aleatorizados, a simple ciego y cruzados, se observó una diferencia estadísticamente significativa en la media del puntaje de preferencia en cuanto al sabor a favor del cefdinir respecto de los otros agentes utilizados como

comparación (4.30 versus 3.99, respectivamente, $p < 0.001$).

Trabajos Distinguidos, Serie Pediatría , integra el Programa SIIC de Educación Médica
Continuada