

Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Artículos originales y seleccionados se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura atenta del trabajo, se indica en el sector Respuestas Correctas, acompañada del fundamento escrito por el especialista que elaboró la pregunta.

TD N°	Enunciados	Seleccione sus opciones
1	El análisis factorial de la escala CY-BOCS muestra que la presentación del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en niños y adolescentes difiere de la del adulto porque:	A) El factor de prevención de daño incluye menos síntomas que en la escala Y-BOCS. B) Se analizó un número menor de escalas para niños. C) El factor de compulsiones es mayor que el de obsesiones y los síntomas se agruparon en un mayor número de factores. D) Los adultos tenían mayor variabilidad de los síntomas.
2	El uso del término «representación» es:	A) Sistemáticamente ambiguo. B) Sistemáticamente unívoco. C) Internamente coherente. D) Ninguna de las anteriores.
3	Señale la opción correcta en cuanto al tratamiento de los pacientes con trastorno depresivo mayor (TDM) leve:	A) La administración de 60 mg de duloxetina en una toma diaria resultó efectiva. B) La duloxetina sólo es efectiva para el tratamiento del TDM grave. C) La duloxetina sólo es efectiva para el tratamiento del TDM moderado. D) La administración de 60 mg de duloxetina en una toma diaria no resultó efectiva.
4	Señale la opción correcta con respecto a la adaptación psicosocial al cáncer.	A) Para obtener conclusiones sobre la adaptación psicosocial se debe efectuar una evaluación psicológica específica. B) Las intervenciones adecuadas reducen el malestar emocional, mejoran la calidad de vida y disminuyen los síntomas. C) Al evaluar al paciente oncológico deben considerarse los aspectos psicosociales y aplicarlos en la atención médica. D) Todas las opciones son correctas.
5	Acerca de los niveles séricos de factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF) y la aparición de trastornos psiquiátricos durante el período perinatal, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?	A) No existe relación alguna. B) La elevación de los niveles séricos de BDNF reflejaría un aumento del riesgo de trastornos del estado de ánimo. C) La disminución de los niveles séricos de BDNF reflejaría una reducción del riesgo de trastornos del estado de ánimo. D) La disminución de los niveles séricos de BDNF reflejaría un aumento del riesgo de trastornos del estado de ánimo.
6	¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a la depresión puerperal?	A) La disminución de la concentración cerebral de valina estaría relacionada con la depresión puerperal. B) Existiría un trastorno del funcionamiento del sistema noradrenérgico. C) El control de las emociones sería adecuado. D) Existiría un trastorno del funcionamiento del sistema serotoninérgico.
7	En cuanto al riesgo de enfermedad cardiovascular entre los pacientes con enfermedad mental grave, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?	A) Dichos pacientes no requieren intervenciones especiales para disminuir los factores de riesgo cardiovascular. B) No es útil reducir la frecuencia de tabaquismo, detectar diabetes e implementar dietas y rutinas de ejercitación. C) Entre los pacientes con enfermedad mental grave los factores de riesgo cardiovascular son mínimos. D) Estos pacientes requieren intervenciones más intensivas para disminuir los factores de riesgo cardiovascular.
8	Indique la opción correcta en relación con la ideación suicida y la farmacoterapia de los pacientes con un trastorno bipolar:	A) La adición de un antipsicótico atípico como la olanzapina podría ser útil para disminuir la ideación suicida. B) La adición de olanzapina sólo sería útil para disminuir la ideación suicida de los pacientes que responden al litio. C) La adición de olanzapina sólo sería útil para reducir la ideación suicida de los pacientes que responden al divalproato. D) La adición de olanzapina no modificaría la ideación suicida.
9	Para el tratamiento de los pacientes con trastornos del espectro autista y síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad:	A) La atomoxetina no sería efectiva. B) La atomoxetina sería efectiva pero tendría un perfil intolerable de efectos adversos. C) La atomoxetina sería efectiva. D) El metilfenidato tendría mejor perfil de efectos adversos en comparación con la atomoxetina.
10	En cuanto a la posibilidad de alcanzar la remisión entre los pacientes esquizofrénicos, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?	A) La administración de antipsicóticos típicos se asoció con resultados menos favorables en comparación con olanzapina. B) La administración de antipsicóticos típicos se asoció con resultados favorables en comparación con olanzapina. C) La administración de risperidona se asoció con resultados favorables en comparación con olanzapina. D) La administración de quetiapina se asoció con resultados favorables en comparación con olanzapina.
11	Señale la opción correcta con respecto a las variables psicológicas que pronosticarían las conductas antisociales:	A) Las características de la personalidad, particularmente la desinhibición, predijeron el menor riesgo. B) La sinceridad sería un factor de riesgo con gran valor predictivo. C) La búsqueda de excitación no representó un factor de riesgo para la manifestación de conductas antisociales. D) La impulsividad fue un factor de riesgo. Los jóvenes irreflexivos serían más propensos a las conductas antisociales.

Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas	Fundamentos
1	C	El factor de compulsiones es mayor que el de obsesiones y los síntomas se agruparon en un mayor número de factores.
2	A	Sistemáticamente ambiguo.
3	A	La administración de 60 mg de duloxetina en una toma diaria resultó efectiva.
4	D	Todas las opciones son correctas.
5	D	La disminución de los niveles séricos de BDNF reflejaría un aumento del riesgo de trastornos del estado de ánimo.
6	D	Existiría un trastorno del funcionamiento del sistema serotoninérgico.
7	D	Estos pacientes requieren intervenciones más intensivas para disminuir los factores de riesgo cardiovascular.
8	A	La adición de un antipsicótico atípico como la olanzapina podría ser útil para disminuir la ideación suicida.
9	C	La atomoxetina sería efectiva.
10	A	La administración de antipsicóticos típicos se asoció con resultados menos favorables en comparación con olanzapina.
11	D	La impulsividad fue un factor de riesgo. Los jóvenes irreflexivos serían más propensos a las conductas antisociales.