

# Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Artículos originales y seleccionados se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura atenta del trabajo, se indica en el sector Respuestas Correctas, acompañada del fundamento escrito por el especialista que elaboró la pregunta.

TD N°	Enunciados	Seleccione sus opciones
1	¿Cuál de las siguientes es la estrategia terapéutica más costoefectiva para los pacientes bipolares?	A) El tratamiento agudo con antipsicóticos. B) El tratamiento exclusivo de los episodios agudos. C) La terapia de mantenimiento con estabilizadores del estado de ánimo. D) La terapia de mantenimiento con antidepresivos tricíclicos.
2	Señale la opción correcta sobre los receptores glutamatérgicos metabotrópicos:	A) Participarían en la regulación de la supervivencia celular. B) Participarían en la regulación de la proliferación celular. C) Participarían en la regulación de la diferenciación celular. D) Todas son correctas.
3	¿Cuál de las siguientes sustancias aumenta el riesgo de síndrome serotoninérgico en combinación con el uso de éxtasis?	A) Metanfetamina. B) Cocaína. C) A y B son correctas. D) Ninguna es correcta.
4	¿Qué efecto tiene la disociación sobre los resultados de la psicoterapia?	A) Positivo. B) Nulo. C) Negativo. D) Ninguna es correcta.
5	¿Qué factores pueden regular la generación de nuevas neuronas?	A) La estimulación ambiental y el estrés. B) El aprendizaje. C) Numerosas drogas. D) Todas son correctas.
6	¿Qué droga provoca una respuesta más temprana en caso de recaída maníaca en pacientes bipolares tratados con litio?	A) Valproato. B) Olanzapina. C) La respuesta a ambas drogas demora lo mismo. D) Ninguna es correcta.
7	La eficacia de la duloxetina en los pacientes con depresión ansiosa es:	A) Superior a la observada en pacientes con depresión no ansiosa. B) Inferior a la observada en pacientes con depresión no ansiosa. C) Igual a la observada en pacientes con depresión no ansiosa. D) La droga no es eficaz en pacientes con depresión ansiosa.
8	¿Cómo es la comorbilidad entre el TDAH y el trastorno oposicionista desafiante?	A) Elevada. B) Baja. C) Nula. D) Ninguna es correcta.
9	Señale la opción correcta respecto de la eficacia de la duloxetina:	A) Es elevada en pacientes añosos exclusivamente. B) Sólo se observan beneficios en pacientes de sexo masculino y raza blanca. C) Es más elevada en el ámbito de la atención primaria. D) Ninguna opción es correcta.

## Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas	Fundamentaciones	Opción
1	La terapia de mantenimiento con estabilizadores del estado de ánimo.	El tratamiento de mantenimiento con estabilizadores del estado de ánimo es más económico que el manejo exclusivo de los episodios agudos.	C
2	Todas son correctas.	Se propone que los receptores glutamatérgicos metabotrópicos tienen un papel clave en la regulación de procesos biológicos como la proliferación, la diferenciación y la supervivencia celular.	D
3	A y B son correctas.	El uso de dosis elevadas o repetidas de estimulantes como la metanfetamina o la cocaína en combinación con éxtasis aumenta la liberación de serotonina y la posibilidad de aparición de un síndrome serotoninérgico.	C
4	Negativo.	La disociación afecta negativamente los resultados del tratamiento. Esto se observa en diferentes trastornos no psicóticos, especialmente afectivos.	C
5	Todas son correctas.	La estimulación ambiental, el aprendizaje, factores del crecimiento, los glucocorticoides y las hormonas sexuales, el estrés, el envejecimiento, los neurotransmisores y numerosas drogas regulan la neurogénesis.	D
6	Olanzapina.	Aunque ambas drogas tienen eficacia similar, los pacientes tratados con olanzapina presentaron una mejora más temprana de los síntomas maníacos e hipomaniacos en comparación con los que recibieron valproato.	B
7	Superior a la observada en pacientes con depresión no ansiosa.	La eficacia de la duloxetina en pacientes con depresión ansiosa es algo superior en comparación con la eficacia en sujetos con depresión no ansiosa.	A
8	Elevada.	Se halló una incidencia elevada de comorbilidad entre TDAH y trastorno oposicionista desafiante.	A
9	Ninguna opción es correcta.	La administración de 60 mg de duloxetina una vez al día es efectiva y bien tolerada para el tratamiento de los pacientes con trastorno depresivo mayor independientemente de la edad, el sexo, el origen étnico o el ámbito de atención.	D