

Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

Síntomas Prodrómicos en la Esquizofrenia

C. Subtipo paranoide y formas de inicio agudo.

Fundamentación: Mientras que los síntomas de desorganización son los más frecuentes dentro del subtipo no paranoide, en el subtipo paranoide los síntomas más frecuentes son los delirantes. Por su parte, en las formas de inicio agudo los síntomas prodrómicos más frecuentes son los delirantes, mientras que en las formas de comienzo insidioso, los síntomas más frecuentes son los de desorganización.

El Trastorno por Estrés Postraumático y el Dolor Crónico están Estrechamente Vinculados

A. Ansiedad.

Fundamentación: Los pacientes con trastorno por estrés postraumático o con dolor crónico experimentan niveles elevados de ansiedad.

Tratamiento de la Disfunción Sexual Asociada con el uso de Antidepresivos

A. Aumento de la libido.

Fundamentación: El sildenafil, como ya fue informado en estudios anteriores, no aumenta en forma directa la libido.

Morbilidad Psiquiátrica Oculta: Comprueban Subdiagnóstico de Depresión y Ansiedad

A. Son diagnosticados en consultas posteriores

Fundamentación: La mayoría de los pacientes que no son diagnosticados en la primera consulta, sí lo son en consultas posteriores, o la depresión remite sin tratamiento. Algunos permanecen sin diagnóstico, pero el porcentaje aparenta ser inferior al que se había calculado con anterioridad.