

Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Artículos originales, distinguidos y Novedades distinguidas se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura atenta del trabajo, se indica en el sector Respuestas Correctas, acompañada del fundamento escrito por el especialista que elaboró la pregunta.

TD N°	Enunciados	Seleccione sus opciones
1	Cuáles de los siguientes son considerados factores de riesgo para desarrollar efectos secundarios psiquiátricos inducidos por el IFN-alfa.	A) El abuso de drogas actual o en el pasado y los trastornos psiquiátricos. B) La interrupción del tratamiento. C) El antecedente de más de 5 años de contraída la infección. D) El antecedente familiar de trastornos psiquiátricos.
2	¿Qué factores son importantes para comprender los trastornos en el comportamiento social de pacientes con esquizofrenia?	A) Duración de la enfermedad. B) "Teoría de la mente". C) Percepción social. D) Todos ellos.
3	¿Qué dosis de atomoxetina es útil en pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD) en combinación con trastorno oposicionista desafiante (ODD)?	A) 1.8 mg/kg/día. B) La atomoxetina no es útil en estos enfermos. C) Depende de la gravedad de los síntomas de ADHD. D) Depende de la gravedad de los síntomas de ODD.
4	¿Qué agente produce con mayor frecuencia exacerbación de los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo?	A) Risperidona. B) Olanzapina. C) Clozapina. D) Quetiapina.
5	El aripiprazol es metabolizado principalmente a través de:	A) El sistema no microsómico hepático. B) Los citocromos P450 3A4 y 2D6. C) Reacciones de glucuronidación. D) El citocromo 2C19.
6	¿Cuáles fueron los hallazgos en la polisomnografía de los niños con ADHD en comparación con aquellos sin este trastorno?	A) Índices de despertares y de apnea/hipopnea normales en ambos grupos. B) Mayores índices de despertares y de apnea/hipopnea en los niños con ADHD. C) Menores índices de despertares y de apnea/hipopnea en los niños sin ADHD. D) Mayor índice de despertares pero índice de apnea/hipopnea normal en los niños con ADHD.
7	La duloxetina es un nuevo fármaco antidepresivo que tiene como mecanismo de acción:	A) La inhibición de la recaptación de serotonina. B) La inhibición de la recaptación de noradrenalina. C) La inhibición de la recaptación de tiramina. D) La inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina.
8	En relación con los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia (SCPD), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?	A) Los SCPD no son frecuentes en los pacientes con demencia. B) Dos tercios de la población que padece demencia vive en los países en vías de desarrollo. C) La prevalencia de la demencia es muy baja en los países en vías de desarrollo. D) Las manifestaciones de la demencia han sido muy estudiadas en los países en desarrollo.
9	Se ha postulado que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina como la venlafaxina pueden aumentar la presión arterial en virtud de:	A) La inhibición de la recaptación de serotonina. B) La inhibición de la recaptación de noradrenalina. C) Efectos antihistaminérgicos. D) Efectos bloqueantes alfa-adrenérgicos.
10	¿Cuáles son las consecuencias de la depresión?	A) Altera sustancialmente el funcionamiento social y ocupacional. B) Aumenta la mortalidad. C) Incrementa notablemente el costo sanitario. D) Todas ellas.

Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas Correctas	Fundamentaciones
1	A	Hasta ahora, el abuso de drogas actual o en el pasado, así como los trastornos psiquiátricos inducidos por el IFN-alfa
2	D	Todos ellos.
3	A	1.8 mg/kg/día.
4	C	Clozapina.
5	B	Los citocromos P450 3A4 y 2D6.
6	A	Índices de despertares y de apnea/hipopnea normales en ambos grupos, sin diferencias estadísticamente significativas.
7	D	La inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina.
8	B	Dos tercios de la población que padece demencia vive en los países en vías de desarrollo.
9	B	La inhibición de la recaptación de noradrenalina.
10	D	Todas ellas.