

Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Artículos originales y distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura atenta del trabajo, se indica en el sector Respuestas Correctas, acompañada del fundamento escrito por el especialista que elaboró la pregunta.

TD N°	Enunciados	Seleccione sus opciones
1	¿Cuáles son los factores que predisponen a la depresión en los ancianos?	A) Aumento de la monoaminoxidasa y disminución de la concentración de neurotransmisores. B) Las pérdidas físicas, laborales, económicas y el estrés. C) Patologías orgánicas, enfermedades crónicas e invalidantes y la polifarmacia. D) Todas son correctas.
2	¿Qué patrón se observa en la planificación previa de la secuencia motora entre los esquizofrénicos?	A) Nunca realizan una planificación previa. B) Tienen dificultades para la planificación previa. C) Realizan normalmente la planificación previa. D) Tienen más habilidad para realizar una planificación previa.
3	La Escala de Hamilton se utiliza para evaluar síntomas:	A) De deterioro cognitivo. B) De trastornos del sueño. C) Depresivos. D) Psicóticos.
4	El grupo de fármacos que está indicado para el tratamiento de la depresión posparto es el de los:	A) Antidepresivos tricíclicos. B) Inhibidores de la monoaminoxidasa. C) Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. D) Todas son correctas.
5	Respecto del síndrome confusional:	A) Es infrecuente en ancianos. B) No es un trastorno transitorio de la atención. C) En pacientes agresivos no está indicado el tratamiento farmacológico. D) La droga de elección son los neurolepticos, excepto en caso de abstinencia de alcohol o hipnóticos.
6	¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, sobre la base de las respuestas de niños que viven con padres que presentan trastornos psiquiátricos?	A) Los niños pueden discriminar con facilidad un trastorno orgánico de uno psiquiátrico. B) La mayoría sabe que su mamá o papá toma medicación psicotrópica. C) Los chicos catalogaron los días como "buenos" cuando tuvieron mayor interacción con sus padres. D) En la mayoría, ambos padres presentaban trastornos psiquiátricos.
7	Los síntomas principales del síndrome neuroleptico maligno son:	A) Fiebre y rigidez muscular. B) Taquicardia y taquipnea. C) Catatonía y discinesias. D) Alteraciones de la conciencia.
8	La clozapina, el primero de los antipsicóticos atípicos aprobado, si bien es una droga muy eficaz está limitada por:	A) Su costo. B) Su intolerancia. C) El perfil de efectos adversos. D) Su baja biodisponibilidad.
9	¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la colestiloquinina en presencia de dolor?	A) Actúa como agonista de los opiáceos a nivel del sistema nervioso central. B) Provoca la inhibición de las vías descendentes del dolor. C) La presencia de dolor crónico disminuye la expresión de ARN mensajero para este neurotransmisor. D) La morfina promueve la liberación de colestiloquinina.
10	¿Qué agentes suelen considerarse de primera elección en el tratamiento de la manía e hipomanía?	A) Litio. B) Valproato. C) Olanzapina. D) Cualquiera de ellos.
11	La sulpirida:	A) Es un antipsicótico típico. B) Es un derivado de las benzamidas sustituidas. C) Es bloqueante D2. D) Todas son correctas.
12	¿Cómo fue el flujo sanguíneo cerebral global durante la remisión de los episodios de depresión del trastorno depresivo mayor en comparación con la fase aguda?	A) Similar. B) Mayor, significativo. C) Menor, no significativo. D) Mayor, no significativo.

Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas	Fundamentaciones
1	Todas son correctas.	Todos los factores mencionados son predisponentes para la aparición de depresión en los ancianos.
2	Tienen dificultades para la planificación previa.	Los resultados revelan que los esquizofrénicos tienen dificultades para planear una secuencia motora con anterioridad a su iniciación.
3	Depresivos.	La Escala de Hamilton se emplea para la evaluación de los síntomas asociados con la depresión.
4	Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.	Los fármacos de primera elección para el tratamiento de la depresión posparto son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
5	La droga de elección son los neurolepticos, excepto en caso de abstinencia de alcohol o hipnóticos.	La droga de elección son los neurolepticos (excepto en el síndrome confusional provocado por abstinencia de alcohol o sedantes hipnóticos).
6	Los chicos catalogaron los días como "buenos" cuando tuvieron mayor interacción con sus padres.	Dicha interacción comprendió mayor comunicación con sus padres y mayor sensación de afecto.
7	Fiebre y rigidez muscular.	Los síntomas principales del síndrome neuroleptico maligno son la fiebre y la rigidez muscular.
8	El perfil de efectos adversos.	El perfil de efectos adversos de la clozapina, particularmente la agranulocitosis, limita la excelente eficacia antipsicótica de este fármaco.
9	La morfina promueve la liberación de colestiloquinina.	De esta manera, se puede mantener un equilibrio entre los sistemas endógenos antinociceptivos y pronociceptivos.
10	Cualquiera de ellos.	Aunque las recomendaciones vigentes varían ampliamente en relación con la terapia de elección del trastorno bipolar, suelen coincidir en que la monoterapia con cualquiera de estos agentes es una buena opción.
11	Todas son correctas.	La sulpirida es un antipsicótico derivado del grupo de las benzamidas sustituidas, presenta ligera actividad antiemética, sedante y bloqueante alfaadrenérgica.
12	Mayor, significativo.	Hubo un incremento significativo del flujo sanguíneo cerebral global durante la remisión en comparación con las fases de depresión del trastorno depresivo mayor.