

## Autoevaluaciones de Lectura

Por cada artículo de las secciones Expertos Invitados y Artículos Seleccionados se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La afirmación acertada, que surge de la lectura atenta del trabajo, es citada en la página Respuestas Correctas, acompañada de una breve fundamentación.

Nº	Enunciación	Seleccione su opción
1	¿Qué beneficios tendría el uso de probióticos orales en la vaginosis bacteriana?	A) En algunos casos se ha logrado la erradicación bacteriana. B) Se ha demostrado la erradicación bacteriana en la mayoría de las pacientes. C) Sólo se han comprobado beneficios para la cepa <i>Lactobacillus rhamnosus</i> . D) No se han obtenidos resultados apreciables.
2	¿Cuáles son las características de los paragangliomas no funcionantes?	A) Son muy frecuentes y benignos. B) Su localización más común es el retroperitoneo. C) Su localización renal es muy rara. D) Son siempre malignos.
3	¿Cuál es el valor de la tira reactiva en el diagnóstico de la infección del tracto urinario (ITU) en lactantes?	A) La presencia de leucocituria es altamente sensible y específica. B) Sólo es sensible la presencia de nitrituria. C) Es una prueba de baja especificidad. D) Es un método fiable para descartar o confirmar la infección.
4	¿Qué efecto tiene la dieta sobre los síntomas en el tracto urinario inferior en hombres?	A) No se ha podido demostrar relación alguna. B) El riesgo aumenta con el mayor consumo de carne vacuna. C) El riesgo aumenta con el mayor consumo de manteca. D) No se observaron efectos positivos con el consumo de vegetales.
5	¿En qué caso la citometría de flujo de orina debe ser complementada con microscopia?	A) En la diferenciación de cilindros. B) En la identificación de bacterias. C) En la detección de espermatozoides. D) En la identificación de eritrocitos.
6	¿Cuál de los siguientes fenómenos se asoció con mayor beneficio del tadalafilo en pacientes con diabetes y disfunción eréctil?	A) Tratamiento simultáneo con antihipertensivos. B) Tratamiento simultáneo con drogas hipocolesterolémicas. C) Diabetes tipo 1. D) Diabetes de corta duración.
7	¿Cuánto tarda habitualmente la recuperación de la función eréctil luego de la prostatectomía por cáncer?	A) Habitualmente 30 días. B) Aproximadamente 2 meses. C) No suele haber recuperación antes de los 5 años. D) Debe esperarse en el transcurso de los dos años que siguen a la intervención.
8	¿Cuál de los siguientes parámetros influye considerablemente en la variabilidad de la dimensión renal en la población de Brasil?	A) Talla. B) Peso corporal. C) Sexo. D) Ninguna.
9	¿Qué parámetro está alterado en el semen de los varones infectados por HIV?	A) El número total de espermatozoides. B) El pH del semen. C) La concentración de espermatozoides. D) La morfología de los espermatozoides.
10	¿Qué diferencias se observan después de la cirugía con láser y la resección prostática transuretral en pacientes con síntomas de la vía urinaria inferior?	A) Menor frecuencia de impotencia con el tratamiento. B) Mayor disfunción eréctil con la cirugía convencional. C) Mayor dolor durante la eyaculación con la cirugía. D) Mejoría del dolor y de la función eréctil con la cirugía.
11	¿Cuál fue el índice de prevalencia de hipospadias en hijos varones nacidos de mujeres expuestas in utero al dietilestilbestrol?	A) 21.3 B) 12.2 C) 35.8 D) 0.9
12	¿Con cuál de los siguientes parámetros evolutivos se asoció el volumen de cirugías por hospital, en prostatectomía radical?	A) Menor mortalidad. B) Menor índice de complicaciones posquirúrgicas y urinarias. C) Menor incidencia de incontinencia urinaria a largo plazo. D) Todas ellas.

## Autoevaluaciones de Lectura

### Respuestas Correctas

Nº	Respuestas	Fundamentación	Clave
1	En algunos casos se ha logrado la erradicación bacteriana.	El uso de probióticos orales puede lograr cierto grado de restauración y mantenimiento de la flora vaginal normal y, en algunos casos, erradicar la vaginosis bacteriana asintomática. Se propone la realización de estudios adicionales para confirmar estos resultados.	A
2	Su localización renal es muy rara.	Los paragangliomas son tumores poco frecuentes, en su mayor parte benignos. Entre los no funcionantes, la localización a nivel renal es casi excepcional y la más frecuente es en la cabeza y en el cuello, seguida del retroperitoneo.	C
3	Es una prueba de baja especificidad.	La leucocituria en la tira reactiva permite seleccionar un grupo de pacientes con mayor probabilidad de presentar ITU, pero su baja especificidad es un obstáculo para su utilización como único test. La nitrituria mejora los resultados, pero es un hallazgo poco constante.	C
4	El riesgo aumenta con el mayor consumo de carne vacuna.	En este estudio poblacional se comprobó aumento del riesgo asociado con el consumo de carne vacuna y disminución con el de vegetales. Curiosamente, se observó disminución del riesgo con el mayor consumo de manteca.	B
5	En la diferenciación de cilindros.	La citometría de flujo en orina debe complementarse con la evaluación microscópica en la diferenciación de cilindros.	A
6	Tratamiento simultáneo con antihipertensivos.	El tratamiento simultáneo con fármacos antihipertensivos influyó favorablemente en la respuesta al tadalafilo en dosis de 20 mg.	C
7	Debe esperarse en el transcurso de los dos años que siguen a la intervención.	La disfunción eréctil puede persistir hasta dos años después de la intervención.	A
8	Talla.	En dicha población, el sexo y el peso corporal no contribuyen significativamente con la variabilidad en la dimensión de los riñones. La talla fue la única variable relacionada con el tamaño del riñón.	A
9	El número total de espermatozoides.	El volumen del eyaculado y el número total de espermatozoides es significativamente menor en los pacientes HIV positivos que en los controles.	A
10	Mejoría del dolor y de la función eréctil con la cirugía.	Aunque la cirugía convencional y el tratamiento con láser se asocian con disminución de la eyaculación, otros aspectos de la función sexual, en particular la función eréctil y el dolor o las molestias durante la eyaculación, mejoran significativamente después de la cirugía convencional.	D
11	21.3	Los hijos de madres expuestas in utero a la hormona tuvieron 20 veces más riesgo de desarrollar hipospadias.	A
12	Menor índice de complicaciones posquirúrgicas y urinarias.	Un mayor volumen de cirugías por centro se asoció con menor índice de complicaciones posquirúrgicas y urinarias tardías pero no con menor índice de mortalidad o de incontinencia a largo plazo.	B