



Colección
Trabajos Distinguidos
Serie
Urología

Volumen 2, Número2, Marzo 2005

Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

ANALIZAN LAS CONSECUENCIAS DE LA DIABETES EN LA DISFUNCION ERECTIL: ESTUDIOS CLINICOS CON TADALAFILO

D. En prácticamente todos los casos.

Fundamentación: El tadalafilo, ingerido según demanda, es bien tolerado y mejora sustancialmente la funcionalidad eréctil en estos pacientes hasta 36 horas después de su ingesta, a pesar de la gravedad de la alteración e independientemente del control metabólico y del tratamiento endocrinológico.

AVANCES EN LA TERAPIA DE REEMPLAZO DE TESTOSTERONA

A. Por la mañana.

Fundamentación: La secreción de testosterona tiene un ritmo circadiano, con máxima secreción por la mañana.

EL TADAFILO MEJORA LA FUNCION ERECTIL

A. Cefaleas.

Fundamentación: El tratamiento con tadalafilo a demanda puede producir cefaleas.

RECOMENDACIONES DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS PARA EL CANCER DE PENE

C. La amputación parcial requiere la remoción del tumor con un margen libre de 2 cm.

Fundamentación: Aunque esto resulte probablemente más que lo necesario, es esencial lograr un margen libre de tumor mediante confirmación histopatológica. Un margen quirúrgico de 10 mm parece seguro, pero debería ser de 15 mm para los tumores en estadio G3.
