
Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

PRIAPISMO METASTASICO SECUNDARIO A CARCINOMA TRANSICIONAL DE VEJIGA

D. Secundario a la invasión tumoral del cuerpo cavernoso.

Fundamentación: El priapismo metastásico es, con mayor frecuencia, secundario a la afección de los cuerpos cavernosos, seguida del glande y del cuerpo esponjoso.

UTILIDAD DE LA REPETICION DE BIOPSIA DE PROSTATA EN PACIENTES DE RIESGO

D. Una segunda biopsia en pacientes de riesgo mejora el rendimiento diagnóstico y elimina la frecuencia de falsos negativos de carcinoma prostático.

Fundamentación: La repetición de la biopsia seriada de próstata en sujetos con sospecha clínica, ecográfica o por nivel de APE mejora el rendimiento diagnóstico global de cáncer prostático en 33.6%.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA DISFUNCION SEXUAL MASCULINA

C. Se indica realizar tacto rectal y determinación de antígeno prostático específico, antes de comenzar el tratamiento, cada 3 o 6 meses durante el primer año, y luego anualmente.

Fundamentación: En los pacientes de alrededor de 40 años se indica realizar tacto rectal y determinación de antígeno prostático específico, antes de comenzar el tratamiento, cada 3 o 6 meses durante el primer año, y luego anualmente. En caso de que algún parámetro se encuentre alterado se debe realizar biopsia prostática con guía ecográfica.
