



Volumen 2, Número 5, Marzo 2006

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

LA PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA PODRIA SER DE ELECCION EN CANCER DE PROSTATA

B. Equivalente a la reportada en la literatura

Fundamentación: La continencia en la prostatectomía radical laparoscópica oscila entre un 80 y 95%, frecuencia equivalente a la observada tras la cirugía "abierta". En la experiencia descrita aquí por los autores, la continencia a los 3 meses fue del 85%.

LA RESECCION DE LA CAPSULA PROSTATICA POR HPB MEJORA LOS RESULTADOS POSOPERATORIOS

C. Resección de una parte del cuello vesical y otra de la cápsula prostática luego de enuclear el adenoma.

Fundamentación: La resección de un segmento de la parte anterior del cuello vesical y un área de la cápsula brinda mejor campo operatorio, permite mejor hemostasia y reduce los receptores alfa que son los responsables de los espasmos posoperatorios.

MECANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA RESISTENCIA A LA QUIMIOTERAPIA INTRAVESICAL

C. Resección de una parte del cuello vesical y otra de la cápsula prostática luego de enuclear el adenoma.

Fundamentación: La mayoría de los estudios mostró una eficacia similar para todos estos agentes.

LA EDAD NO ES LIMITANTE PARA LA PROSTATECTOMIA RADICAL

C. Resección de una parte del cuello vesical y otra de la cápsula prostática luego de enuclear el adenoma.