



Volumen 2, Número 6, Abril 2006

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

COMPARAN TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS PARA LA DISFUNCION ERECTIL

C. Mediante un cuestionario específico.

Fundamentación: Para obtener los datos en los estudios de preferencia sobre drogas para la disfunción eréctil, en principio, se interroga por escrito sobre la rapidez y persistencia de la erección y el grado de tumescencia penéana y los posibles efectos secundarios indeseables. Para cada ítem, se comparan los efectos de distintas drogas y de allí se obtienen las conclusiones sobre la preferencia de los pacientes por un fármaco.

RESULTADOS ALENTADORES DE UNA TECNICA SENCILLA PARA FISTULAS URETROCUTANEAS

D. 2 planos de ácido poliglicólico (dexon o vicril) calibre 6/0.

Fundamentación: Se puede emplear ácido poliglicólico monofilamento de calibre 6/0 en 2 planos, uno de ellos afronta los labios de la fístula cuyo borde se ha recortado previamente, y el segundo, superpuesto al anterior, aproxima la fascia de dartos.

DISCUSIONES RESPECTO DEL UMBRAL DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PARA DEFINIR ANORMALIDAD

A. PSA < 4 ng/ml.

Fundamentación: El nivel de antígeno prostático específico (PSA) considerado normal en la actualidad corresponde a un valor inferior a 4 ng/ml.

LA RADIOTERAPIA EN DOSIS ALTAS MEJORA EL PRONOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA

A. Altas.

Fundamentación: Los resultados de los análisis univariado y multivariado efectuados demostraron que el beneficio de dosis altas de radiación es independiente del empleo de hormonoterapia prolongada.
