
Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

NIVELES BAJOS DE TESTOSTERONA SE ASOCIAN CON MAL PRONOSTICO EN EL CANCER DE PROSTATA

C. Peor pronóstico de la evolución de la enfermedad.

Fundamentación: Algunos estudios demostraron que pacientes con niveles bajos de TT tienen mayor extensión de la enfermedad, pobre respuesta al tratamiento y mayor tasa de recaída, otros encontraron que los varones con CP y niveles preoperatorios altos de testosterona presentan una mejor tasa de sobrevida.

LA TOXINA BOTULINICA ES EFICAZ PARA TRATAR TRASTORNOS UROLOGICOS

D. Como antiinflamatorio de la capa suburotelial de la uretra prostática.

Fundamentación: La toxina botulínica actuaría por inhibición de la liberación de acetilcolina, adenosina trifosfato y sustancia P y, además, por reducción de la incorporación central de factores neurotróficos.

AUSENCIA DE TOLERANCIA A TADALAFILO DURANTE 6 MESES DE TRATAMIENTO

D. Como antiinflamatorio de la capa suburotelial de la uretra prostática.

Fundamentación: La disfunción eréctil suele asociarse con trastornos comórbidos como diabetes mellitus, hiperlipidemia, enfermedad coronaria e hipertensión.

LOS PACIENTES CON DISFUNCION ERECTIL PREFIEREN EL TADALAFILO AL SILDENAFIL

B. El tadalafilo, en forma significativa.

Fundamentación: Un número significativamente mayor de participantes prefirió el tratamiento con tadalafilo frente al sildenafil (69.9% versus 30.4%, $p < 0.01$).
