
Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

CONFORMIDAD DE PACIENTES CON RESULTADOS DE LA COLPOSUSPENSION PARA LA INCONTINENCIA URINARIA

A. Incontinencia urodinámica de esfuerzo más hipermotilidad del cuello vesical y capacidad vaginal adecuada.

Fundamentación: Las indicaciones precisas para la colposuspensión incluyen incontinencia urodinámica de esfuerzo, hipermotilidad del cuello vesical y capacidad vaginal adecuada. El prolapso vaginal del cuello uterino y el del recto pueden manejarse con otro tipo de tratamiento distinto de la operación de Burch.

MAYOR CANTIDAD DE MUESTRAS REDUCEN FALSOS NEGATIVOS EN BIOPSIAS PROSTATICAS

D. Obtención de 12 cilindros por vía transrectal con aguja tru-cut guiada por ecografía.

Fundamentación: Los autores han logrado mejorar el rendimiento diagnóstico de la biopsia prostática obteniendo 12 muestras de diferentes áreas de la glándula con una aguja cortante tipo tru-cut montada en una pistola para disparo, guiando la ubicación precisa del instrumento mediante el transductor de un ecógrafo.

EL TRATAMIENTO CON TESTOSTERONA NO AFECTA LOS NIVELES DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO

D. Ninguno de ellos.

Fundamentación: El tratamiento de reemplazo hormonal origina sólo un incremento leve en la concentración de antígeno prostático en la mayoría de los hombres con hipogonadismo. El efecto no parece estar afectado por la edad del paciente, el tipo de terapia o la concentración inicial de testosterona o antígeno prostático específico.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA TERAPIA CON SILDENAFIL

D. Ninguno de ellos.

Fundamentación: Se estima que en el transcurso de 3 años, más del 50% de los pacientes interrumpe el tratamiento con sildenafil por diversos motivos.

Trabajos Distinguidos, Serie Urología, integra el Programa SIIC de Educación Médica
Continuada