

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE SÍNDROME METABÓLICO Y DISFUNCIÓN ERÉCTIL

C. Significativo sólo en los hombres de 50 años o más.

Fundamentación: El síndrome metabólico se ha correlacionado con disfunción eréctil sólo en los hombres de 50 años o más ($p = 0.01$), con un incremento de disfunción eréctil grave del 48%.

REVISAN LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA DISFUNCIÓN SEXUAL ASOCIADA CON ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

B. La presencia de limitaciones en la movilidad, trastornos afectivos (en especial, depresión) y medicación administrada.

Fundamentación: Además de la afección de los circuitos neurales, otros factores pueden alterar el desempeño sexual de los pacientes, como la fatiga, la medicación recibida, la pérdida de movilidad e independencia, la depresión y el cambio de roles interpersonales; por lo tanto, estas variables deben considerarse en todo plan de rehabilitación destinado a los pacientes neurológicos.

LA PROSTATITIS PODRÍA SER PRECURSORA DEL CARCINOMA PROSTÁTICO

D. Mediante el marcador molecular denominado Ki 67.

Fundamentación: En la atrofia proliferativa prostática es mayor el índice apoptótico, que puede demostrarse mediante el marcador molecular para proliferación denominado Ki 67.

LAS DEFICIENCIAS DE VITAMINA D AUMENTAN EL RIESGO DE ADQUIRIR CÁNCER DE PÓSTATA

A. 25 hidroxivitamina D3

Fundamentación: las otras 3 sustancias mencionadas tienen estructura química similar pero carecen de los atributos pertinentes para ser considerados marcadores plasmáticos del estado de la vitamina D en el organismo.