

# Autoevaluaciones de Lectura

## Respuestas Correctas

TD N°	Respuestas	Fundamentación	Clave
1	Con la excreción de IgG.	La medición de proteínas específicas en orina demostró que el aumento de la excreción de albúmina se asocia con incremento en la excreción de IgG, posiblemente secundaria a reorganización de la matriz proteica de la membrana basal.	A
2	Con la excreción de IgG. Mejora significativa.	Ocho de doce medidas de desempeño mejoraron significativamente un año después de la implementación del algoritmo clínico y la mejora se mantuvo en los siguientes tres años.	A
3	La mayoría de los pacientes tienen más de 30 años.	El dolor testicular crónico (unilateral o bilateral, constante o intermitente, espontáneo o exacerbado por la actividad física o por la presión) puede ocurrir a cualquier edad pero la mayoría de los pacientes tienen más de 30 años.	C
4	Si se sospecha neoplasia de TUS se deben enviar las muestras al laboratorio.	Ya que las células descamadas en la orina degeneran rápidamente, es muy importante que las muestras para citología sean enviadas rápidamente al laboratorio (preferiblemente en fresco y antes de las dos horas de obtenidas).	C
5	Andrógenos.	Los estudios en animales y en seres humanos demostraron que la expresión del gen de la enzima en el pene depende de la presencia de niveles adecuados de andrógenos.	D
6	La TC espiralada sin contraste es el mejor método para detectar cólicos y cálculos.	Las ventajas de la TC incluyen la detección y caracterización precisas de los quistes y masas renales, y la identificación de infecciones renales y pararrenales. Más aun, puede proveer información acerca de las estructuras urinarias.	D
7	En 2 091 casos de adenocarcinoma de próstata localizado hubo 17% de recurrencia.	Con una mediana de seguimiento de $5.9 \pm 4.1$ años se evidenció recurrencia en 360 casos (17%), incluidos 203 con APE detectado en forma aislada (0.2 ng/ml o mayor), 36 con recurrencia local y 121 con metástasis a distancia.	A
8	La prevalencia entre familiares mujeres fue 17 veces más que en la población general.	La encuesta entre miembros de la <i>Interstitial Cystitis Association</i> con CI informada en este estudio reveló una prevalencia de CI en familiares de primer grado de sexo femenino de 17 veces la hallada por Curhan y col. (60/100 000) en mujeres adultas estadounidenses de 31 a 73 años.	B
9	Todas las anteriores	La experiencia acumulada en el manejo de la patología permite afirmar que todos los métodos mencionados se utilizan para el tratamiento de los cálculos ureterales.	D
10	En el 70% a 80% de los pacientes.	La experiencia adquirida con los estudios epidemiológicos permite afirmar que la terapia combinada produce remisión completa y duradera en el 70% a 80% de los pacientes con cáncer testicular.	C
11	Inhibidoras de los receptores alfa adrenérgicos.	La experiencia acumulada con el tratamiento de la hipertrofia prostática benigna permite afirmar la eficacia de las drogas inhibidoras selectivas alfa adrenérgicas para el alivio de los síntomas de la patología.	B
12	El efecto adverso más frecuente de la administración de testosterona en parches son las reacciones cutáneas locales.	Los efectos adversos locales incluyen principalmente eritema leve a moderado y transitorio en algún momento durante el tratamiento, ampollas o, rara vez, dermatitis de tipo alérgica.	D