

Tabla 1. Características de las 29 mujeres gestantes portadoras de hemoglobinopatías estructurales y talasemias.

	Total Hemoglobinopatías (n=29)		β Talasemias (n=6)		Hemoglobinas Estructurales (n=23)		Hemoglobinopatías Estructurales		
	N	%	N	%	N	%	Hemoglobina S	Hemoglobina C	Hemoglobina D /Otras
Raza y/o Etnia									
Caucásica	9	31,03%	5	83,33%	4	17,39%	2	2	-
Negra/Negroide	14	48,27%	-	-	14	60,86%	9	4	1
Magrebí	4	13,79%	1	16,66%	3	13,04%	1	-	2
Indígena Americano	2	6,89%	-	-	2	8,69%	1	1	-
Localización geográfica									
CANARIAS	6	20,68%	4	66,66%	2	86,95%	-	2	-
Lanzarote	5		4		1		-	1	-
Fuerteventura	1		-		1		-	1	-
ESPAÑA PENINSULAR	2	6,89%	-	-	2	8,69%	2	-	-
Cádiz	2		-		2		2	-	-
AFRICA	8	57,58%	1	16,66%	7	30,43%	5	-	2
Marruecos	4		1		3		1	-	2
Cabo Verde	1		-		1		1	-	-
Guinea Bissau	1		-		1		1	-	-
Nigeria	1		-		1		1	-	-
Senegal	1		-		1		1	-	-
AMERICA	13	44,82%	1	16,66%	12	52,17%	6	5	1
Argentina	1		1		-		-	-	-
Ecuador	1		-		1		1	-	-
Belice	1		-		1		1	-	-
Colombia	4		-		4		1	3	-
Republica Dominicana	4		-		4		1	2	1
Cuba	2		-		2		2	-	-
Prevalencia (‰)	11,90		2,46		9,44		5,33	2,87	1,23
Edad media y rango (años)	28,5 (18-36)		29,3 (18-35)		27,8 (18-36)		27,8 (18-36)		