

Tabla 1. Prevalencia del uso de cannabis, frecuencia máxima de uso, dependencia de 12-meses del DSM-IV y síntomas de dependencia del DSM-IV. Las estimaciones están categorizadas para permitir el análisis por muestreo y no-participación (n=1601).

Medición del uso de Cannabis	%	95% IC
Alguna vez usó	59	57 - 62
Frecuencia de uso en los últimos 12 meses		
>4 veces pero menos que en forma mensual	3	3 - 5
1-3 días/mes	4	3 - 5
1-2 días por semana	4	3 - 5
3-4 días por semana	3	2 - 4
Diariamente o casi diariamente	8	6 - 9
Total (usada >4 veces)	21	19 - 24
Dependencia según el DSM-IV (últimos 12 meses)		
% of entire sample	7	6 - 9
% de consumidores ocasionales	13	10 - 15
Síntomas de dependencia del DSM-IV		
Tolerancia	2	1 - 3
Abstinencia	6	5 - 8
Uso pese a la voluntad de no usar	8	6 - 9
Deseo persistente	10	8 - 12
Tiempo excesivo empleado en obtener/en recuperarse	6	5 - 7
Consecuencias sociales	1	1 - 2
Uso continuo a pesar de los problemas de salud	6	4 - 7

Notas:

11 participantes no desearon informar su utilización del cannabis

La dependencia al cannabis fue medida solamente en consumidores que informaron por lo menos un uso máximo semanal en los últimos 12 meses