

Tabla 2 Prevalencia de dependencia al cannabis y síntomas según el DSM-IV por una frecuencia máxima del uso de cannabis en adultos jóvenes en los últimos doce meses. Las estimaciones están categorizadas para permitir el análisis por diseño y no-participación.

	1-2 días/ semana (n = 58)		3-4 días/ semana (n =47)		Casi diariamente (n = 110)		Total: en forma semanal o con mayor frecuencia (n = 215)	
	%	95% IC	%	95% IC	%	95% IC	%	95% IC
Diagnóstico de dependencia	13	6-27	53	37-68	72	61-80	53	46-60
Síntomas de dependencia								
Tolerancia	17	9-29	14	6-30	14	8-22	15	10-20
Abstinencia	21	12-35	43	28-60	58	48-68	46	38-53
Uso sin voluntad de usar	26	16-40	62	46-76	66	56-75	55	47-62
Deseo persistente de usar	45	32-58	68	50-81	84	75-90	71	64-77
Tiempo excesivo para obtener/recuperarse	10	3.7-24	30	18-45	64	53-73	43	36-50
Consecuencias sociales	2	0.3-14	9	4-20	14	9-22	10	7-15
Uso continuado a pesar de los problemas de salud	16	9-28	39	25-56	50	40-61	39	32-47