

**Tabla 3:** Asociaciones predictivas independientes entre los antecedentes y los factores de la adolescencia variables con el tiempo y la dependencia al cannabis a la edad de 20 años: odds ratios (OR) obtenidos de un modelo de regresión logística múltiple.

Mediciones en adolescentes: momentos 1 a 6	Categorías	Dependencia al cannabis a los 20 años		
		OR de p	IC 95%	valor
Antecedentes				
Sexo femenino		0.38	0.22 , 0.66	<0.01
Origen australiano		2.0	0.82 , 4.8	0.13
Padres divorciados/separados		1.0	0.63 , 1.72	0.87
Frecuencia máxima de uso				
De cannabis	Ninguna	1		0.02 <sup>a</sup>
	Menor que semanal	1.7	0.59 , 4.7	
	Semanal	4.9	1.3 , 18.9	
	Diaria	4.6	1.0 , 21.0	
De cigarrillos	Ninguna	1		0.83 <sup>a</sup>
	menor que diaria	0.73	0.18 , 3.0	
	Diaria	0.71	0.1 , 3.8	
Persistencia				
Uso ocasional de cannabis	Efecto lineal <sup>b</sup>	1.1	0.70 , 1.7	0.71
Fuma ocasionalmente cigarrillos	Efecto lineal <sup>b</sup>	1.9	1.1 , 3.2	0.02
Uso frecuente de alcohol	Efecto lineal <sup>b</sup>	0.69	0.46 , 1.0	0.07
Uso riesgoso de alcohol	Efecto lineal <sup>b</sup>	1.1	1.81 , 1.5	0.55
Morbilidad psiquiátrica	Efecto lineal <sup>b</sup>	1.1	0.91 , 1.4	0.26
Comportamiento antisocial 2+	Efecto lineal <sup>b</sup>	1.3	1.0 , 1.7	0.03

<sup>a</sup> Test de Wald de hipótesis nula de ausencia de diferencias en la frecuencia de la dependencia al cannabis en cada categoría.

<sup>b</sup> en las cuatro categorías de: nunca, fase 1, fases 2-3 y fase 4.