

Tabla 2: Información sobre la resolución del segmento ST completa (>70%) luego de las intervenciones percutáneas facilitada y primaria

Estudio	Información RST disponible	RST completa IPC facilitada	RST completa IPC primaria	RST completa PHL	Tiempo desde la intervención	p
Investigaciones con inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa plaquetarias						
Mesquita-Gabriel y col. (ERAMI)	74 FG36/P38	14% 39%	8% 26%	-	Pre-PCI* Post-PCI	n.s. n.s.
Arntz y col. (REOMOBILE)	100 FG52/P48	24%	30%	-	60-90*	n.s.
Zorman y col.	112 FG56/P56	70%	36%	-	65 (IQR 41-110)	0.002
Cutlip y col.	58 FG28/P30	69%	44%	-	90	n.s.
Gyongyosi (ReoProBridging)	55 FG28/P27	61%	22%	-	30	0.004
Zeymer y col. (INTAMI)	102 FG53/P49	61%	67%	-	60 (rango 45-75)	n.s.
Bellandi y col.	55 FG27/P28	78%	46%	-	60	0.034
Ellis y col. (FINESSE)#	745 FG257/FC246/ P242	33%	31%	-	60-90*	n.s.
Hamm y col. (ON-TIME 2)	984 FG491/P493	44.3%**	36.6%**	-	60	0.026
Media	FG1028/P1011	54%***	38%***	-	-	-
Estudios con terapia fibrinolítica						
Fernandez-Aviles y col. (GRACIA-2)	212 FF104/P108	61%	43%	-	Inmediata	<0.01
Van de Werf y col. (ASSENT-4)	1090 FF549/P541	24.4% 51%	15.5% 51%	-	60* 180	0.001 n.s.
Armstrong y col. (WEST)	304 FF104/P100/ PHL100	69%	56%	61%	180	n.s. (tendencia)
Media	FF757/P749/ PHL100	60%	50%	61%	-	-
Estudios con terapia combinada						
ADVANCE-MI	146 FC69/P77	40%	41%	-	60 (rango 45-75)	n.s.
Thiele y col.	300 FC82/P136/ PHL82	80%	52%	52%	90	<0.001
Ellis y col. (FINESSE)	745 FG257/FC246/ P242	44%	31%	-	60-90*	0.003
Media	FC 397/P455	55%	41%	52%	-	-
Media global	IPC facilitada 2182 P 1973/ PHL 182	56%	43%	56%	-	-

FG es IPC facilitada inhibidor de la glicoproteína IIb/IIIa, FC es combinación de fibrinólisis IPC facilitada, FF es IPC facilitada por fibrinolíticos, P es IPC primaria, PHL es el grupo con fibrinólisis pre-hospitalaria, RTS es resolución segmento ST

* Información sobre RTS antes del inflado del balón

** Desviación residual del supranivel ST ≥ 3 mm a los 60 minutos

*** Sin el estudio On-TIME-2 trial debido a un criterio RTS diferente

El ensayo FINESSE tiene una doble mención debido por las tres ramas de tratamiento; con criterios de IPC facilitada comparadas con IPC primaria.