Tabla 2. Concentraciones de creatinina en suero basal y estimulada, índices de excreción de creatina, IFG, Δ IFG y % Δ IFG de cada estudio de **Reserva Funcional Renal**.

Paciente #	Edad	Sexo	[Cr]s basal mg/dL	Estimulado [Cr]s mg/dL	Cr exc basal mg/kg/24 horas	Stim* Cr exc mg/kg/24 horas	IFG basal mL/min/1.73m^2	[Cr]s estimulado* mL/min/1.73m^2	Δ IFG mL/min/1.73m^2	% Δ IFG %
1	12.8	f	0.89	0.83	29.7	20.7	134.4	100.6	-33.9	-25.2
2	13.3	m	1.11	1.02	21.6	26.3	78.8	104.4	25.6	32.4
3	15.6	m	1.00	1.00	31.9	18.9	180.1	106.6	-73.5	-40.1
3	16.8	m	1.17	1.08	18.9	16.6	127.5	121.6	-5.9	-4.6
4	7.5	m	0.66	0.61	15.2	22.9	86.2	140.4	54.2	62.8
5	10.8	m	1.19	0.88	19.8	20.5	66.2	92.8	26.6	28.7
6	9.5	m	0.71	0.73	19.1	18.4	85.9	80.8	-5.2	-6.0
6	10.0	m	0.61	0.60	19.2	22.9	103.1	124.7	21.6	21.0
7	5.8	m	0.64	0.79	17.0	15.8	82.4	62.2	-20.2	-24.5
8	14.5	f	0.86	0.78	16.2	19.4	73.6	97.1	23.5	31.9
9	11.8	m	0.81	0.77	15.2	22.9	64.5	102.1	37.6	58.2
10	18.7	f	1.02	1.00	17.4	19.3	81.8	92.6	10.8	13.2
11	19.3	m	1.43	1.39	23.2	20.4	81.5	73.8	7.7	-9.4
12	6.4	m	0.67	0.66	16.1	19.3	85.5	104.8	19.3	22.6