Table IV. Intervenciones Neonatales Seleccionadas y Resultados Excluyendo Bebes con Anomalías Congénitas Mayores*

	HBDP n=860	**Atendidos por médicos en hospitales n =733**	**HBDP vs médicos valor de p**	**- Parteras que atendieron en hospitales n =563**	**HBDP vs parteras en hospitales valor de p**
Puntaje Apgar < 7 al minuto 1	89 (10.4)	106 (14.5)	0.01	69 (12.3)	0.28
Puntaje Apgar < 7 al minuto 5	8 (.9)	9 (1.2)	0.63	3 (0.5)	0.54
Muerte perinatal#	3 (0.3)	1 (0.1)	0.63	0	0.28
Solamente muertos al nacer	2 (0.2%)	1 (0.1)	1.00	0	0.52
Meconio espeso	50 (5.8)	41 (5.6)	0.85	44 (7.8)	0.14
Aspiración traqueal	24 (2.8)	42 (5.7)	0.003	40 (7.1)	<0.001
IPPV con máscara	44 (5.1)	62 (8.5)	0.008	40 (7.1)	0.12
IPPV by ETT	3 (0.3)	0	0.25	0	0.28
Compresiones torácicas	2 (0.2)	1(0.1)	1.00	3 (0.5)	0.39
Drogas para resuscitación	4 (0.5)	20 (2.7)	0.001	3 (0.5)	0.91
Asfixia natal$	5 (0.6)	6 (0.8)	0.57	1 (0.2)	0.41
Aspiración de meconio	2 (0.2)	1(0.1)	1.00	2 (0.4)	0.65
Peso al nacer < 2500gr	7 (0.8)	15 (2.0)	0.04	4 (0.7))	1.00
Traslado a otro hospital	6 (0.7)	4 (0.5)	0.76	6 (1.1)	0.56
Convulsiones	2 (0.2)	2 (0.3)	1.00	0	0.52
Bebes ventilados ≥ 24 hours	5 (0.6%)	0	0.07	0	0.16
Bebes recibiendo oxígeno ≥24 hrs	14 (1.6)	22 (3.0)	.07	15 (2.7)	.18

*Los bebes con anomalías congenitas fueron excluídos de este análisis. Hubo 5 (0.6%) bebes en el grupo HBDP, 10 (1.4%) en el grupo atendido por médicos; y 8 (1.4%) en el grupo de comparación atendido por parteras. Las anomalías valoradas incluían anomalías del sistema nervioso central, anomalías cardíacas, anomalías del sistema circulatorio o respiratorio, o anomalías relacionadas con anormalidades cromosómicas..

La muerte perinatal se define como muerte al nacer (muerte intrauterina luego de las 20 semanas de gestación) o muerte durante el período de hospitalización asociado con el nacimiento. Esta definición no incluye readmisiones al hospital luego que el infante fuera dado de alta a su hogar.

$ Codificada en la base de datos CIHI como leve, moderada o asfixia severa al nacer.