

Tabla 1 La eficacia clínica del docetaxel semanal en el cáncer de mama avanzado y metastásico

Estudio (año)	Nº.	Línea de quimioterapia	Dosis (mg/m ²)	Esquema (ciclo)	Respuesta (%)			50%TTP	50%SG	Mediana de la dosis total, nº de administraciones (intervalo), ID
					RC	RP	EE≥6M			
Agente único										
Burstein ⁷ (2000)	29	1 ^a o 2 ^a	40	6 semanas dentro, 2 semanas fuera	0	41	17	5 M ^a)	ND	720 mg/m ² , 18 dosis, 30 mg/m ² /sem
Hainsworth ²⁶ (2001)	41	1 ^a o 2 ^a	36	6 semanas dentro, 2 sem fuera (max 4 ciclos)	3	33	19	7 M ^b)	13 M 2a: 29%	12 dosis (3-22) ^g
Kuroi ^{27,28} (2001, 2003)	57	1 ^a o mayor	25	3sem dentro, 1sem fuera	4	26	31	11 M ^c)	NR 3y: 60%	600 mg/m ² (75-2800) 24 dosis (3-105)
Stemmler ²⁹ (2001)	35	1 ^a o mayor	35	6 sem dentro, 2 sem fuera (1er ciclo)→3 sem dentro, 2 sem fuera	3	31	ND	2.6 M	9.4 M	9 dosis (6-22)
Aihara ³⁰ (2002)	37	1 ^a o mayor	40	3 sem dentro, 1 sem fuera (max 6-9 ciclos)	0	38	8	5 M	12 M	560 mg/m ² (120-1080), 4 ciclos (1-9), 28 mg/m ² /sem
Maisano ³¹ (2003)	30	1 ^a o mayor	35	6 sem dentro, 2 sem fuera (max 6 ciclos)	0	33	ND	8 M	ND	10 dosis (4-36)
Mey ³² (2003)	20	2 ^a o mayor	40	3 semanas dentro, 1 semana fuera (max 6 ciclos)	0	25	ND	8.8 M	2a: 10%	380 mg/m ² 9.5 dosis (1-18)
Ramos ³³ (2003)	35	2 ^a o mayor	40 → 36 ^d	6 sem dentro, 2 sem fuera (max 4 ciclos)	6	28	ND	8.4 M	13.6 M	698 o 648 mg/m ² , respectivamente 18 dosis (6-24)
D'hondt ³⁴ (2004)	47	1 ^a o mayor	36	6 sem dentro, 1 sem fuera (1er ciclo)→2 o 3 sem dentro, 1 sem fuera	0	30	ND	14 sem	28 sem	278 mg/m ² , 28 mg/m ² /sem
Raff ³⁵ (2004)	35	1 ^a o mayor	33 → 40 ^d	Cada sem (n=21)→ 3 sem dentro, 1 sem fuera (n=14) ^d	0	21	ND	4.5 M	10.5 M	13 o 9 dosis, respectivamente Mean DI 30, 31 mg/m ² /sem, respectivamente
Stemmler ³⁶ (2005)	54	1 ^a	35	6 sem dentro, 2 sem fuera (1er ciclo)→3 sem dentro, 2 sem fuera (max 5 ciclos)	11	37	ND	5.9 M	15.8 M	ND
Docetaxel + Trastuzumab (4 mg/kg de dosis de carga, 2 mg/kg en adelante) en el cáncer de mama con sobreexpresión de HER-2										
Meden ³⁹ (2001)	12	2 ^a o mayor	35	6 sem dentro, 2 sem fuera	0	50	ND	16.5 sem ^f)	ND	76 dosis de docetaxel, 80 de trastuzumab
Esteva ⁴⁰ (2002)	30	1 ^a o 2 ^a	35	3 sem dentro, 1 sem fuera	0	63	ND	9 M	ND	6 ciclos (2-16), 24 mg/m ² /sem
Raff ³⁵ (2004)	17	1 ^a o mayor	33 → 40 ^d	Cada semana (n=2)→ 3 sem dentro, 1 sem fuera (n=15) ^d	0	59	ND	8.5 M	17.8 M	16 dosis, 25 mg/m ² /sem
Tedesco ⁴¹ (2004)	26	1 ^a o mayor	35	6 sem dentro, 2 wks off	8	42	31 ^g	12.4 M	22.1 M	23.8 mg/m ² /sem

Abreviaturas: RC, Respuesta completa; ID, Intensidad de la dosis; ND, no disponible; NA, no se alcanzó; ED, Estado de desempeño; TTP, Tiempo hasta la progresión; SG, supervivencia global; RP, respuesta parcial; EE, enfermedad estable.

a) Mediana del tiempo del estudio, b) Para responder y estabilizar al paciente, c) El tiempo hasta el fracaso del tratamiento, d) Se cambio el esquema o la dosificación debido a la toxicidad 2) Cáncer de mama negativo para HER-2 f) La mediana de la duración de la respuesta g) EE que dura 2.5 M.