

Tabla 2 Resumen de los sucesos adversos con el docetaxel semanal en el cáncer de mama avanzado o metastásico

Estudio (año)	Dosis de docetaxel (mg/m ²)	Corticoides (Pre / Pos)	Adverse events (NCI-CTC) (%)								Cambios ungueales
			Neutropenia	Nausea, vómitos	Astenia, fatiga	Neurosensorial	Piel	Retención hídrica	Lagrimeo	Global	
			G1,2 G3,4	G1,2 G3,4	G1,2 G3,4	G1,2 G3,4	G1,2 G3,4	G1,2 G3,4	G1,2 G3,4		
Agente único											
Esquema 6 sem dentro, 2 sem fuera											
Burstein ⁷⁾ (2000)	40	D 8 mg VO x 3	28 14	35 3	58 14	17 3	3 0	45	52 0	14	
Hainsworth ²⁶⁾ (2001)	36	D 8 mg VO x 2 / D 8 mg VO	ND 4 ^{b)}	ND 7	ND 20	ND 0 ^{b)}	ND 0	N D7	ND ND	ND	
Maisano ³³⁾ (2003)	35	D 8 mg iv	0 10	17 0	37 7	10 3	20 7	3	73 3	42 ^{c)}	
Ramos ³⁵⁾ (2003)	40 36	D 8 mg iv / VOst; D 8 mg VO	ND 28 ND 6	ND 11 ^{d)} ND 0	ND 28 ND 6	ND 0 ND 6	ND 0 ND 12	ND 0 ND 6	ND 11 ND 18	17 ^{c)} 41 ^{c)}	
6 sem dentro, seguido del esquema modificado											
Stemmler ²⁹⁾ (2001)	35	D 8 mg iv	40 9	15 0	15 0	15 0 ^{b)}	26 ^{a)}	0	0 6	26 ^{a)}	
D'hondt ³⁴⁾ (2004)	36	M 32 mg VO x 2 / M 32 mg VO x 2	16 22	ND ND	57 0	21 2	ND ND	28	19 0	28	
Stemmler ³⁶⁾ (2005)	54	D 8 mg iv	37 4	22 4	13 6	17 0	ND ND	13	11 0	13	
3 sem dentro, 1 sem fuera schedule											
Kuroi ^{27,28)} (2001, 2003)	25	D 8 mg or H 100 mg iv	12 2	5 0	17 0	6 0	13 0	8	17 0	44	
Aihara ³⁰⁾ (2002)	40	D 8 mg iv	32 19	19 0	35 0	8 0	11 0	5	13 0	28	
Mey ³²⁾ (2003)	40	D 8 mg VO x 2 + 16 mg iv	20 ^{b)} 10 ^{b)}	20 ^{b)} 5 ^{b)}	10 ^{b)} 0 ^{b)}	10 ^{b)} 0 ^{b)}	25 ^{b)}	10 ^{b)} 0 ^{b)}	ND ND	25 ^{b)}	
Docetaxel + trastuzumab en el cáncer de mama con sobreexpresión de Her-2											
6 sem dentro, 2 sem fuera del esquema											
Menden ³⁹⁾ (2001)	35	D 8 mg iv	8.5 ^{a)} 0 ^{a)}	ND 0	ND 0	ND 0	ND 0	42	8.5 0	25	
Tedesco ⁴³⁾ (2004)	35	D / D, DF optional	23 11	ND ND	58 11	35 2 ^{b)}	ND ND	15	ND ND	ND	
3 sem dentro, 1 sem fuera del esquema											
Esteva ⁴⁰⁾ (2002)	35	D 4 mg VO x 3 (→x 2 →x 1)	49 26	ND ND	62 20	36 3 ^{b)}	ND ND	26	93 0	50	
Docetaxel sólo en el cáncer de mama negativo para HER-2 o en combinación con trastuzumab en el cáncer de mama con sobreexpresión de HER-2											
Raff ⁴²⁾ (2004)	33→40 ^{b)}	D 8 mg VO x 2 + 8 mg iv, DF 25-50 mg iv	21 21	18 ^{d)} 4 ^{d)}	42 4	23 4	23 0	23	42 4	35	

Abreviaturas: D, dexametasona; DF, diferhidramina; H, hidrocortisona; M, metilprednisolona; ND, no disponible.

a) Leucocitopenia, b) Neuropatía, c) Toxicidades Grado 3, 4, d) Vómitos, e) Cambios en piel y uñas Grado 2, f) Grado 2 por criterios de OMS, g) Criterios de la OMS, h) Cambios de piel y uñas Grado 2-4, i) El esquema o la dosificación se cambió debido a la toxicidad.