

Tabla 4 Los estudios de la terapia combinada con docetaxel semanal

Estudio (Año)	No.	Dosis de TXT (mg/m <sup>2</sup> )	Dosis de la droga combinada (mg/m <sup>2</sup> )	Esquema (ciclo)	DLT / eventos adversos mayores	Respuesta	Dosis recomendada
<b>TXT + gemcitabina or vinorelbina</b>							
Frasci <sup>48</sup> (2000)	TXT+G 19 <sup>a)</sup> TXT+V15 <sup>a)</sup>	30-45	1000 25	2 sem dentro, 1 sem fuera	Neutropenia	IR: TXT+G 16%, TXT+V 13%	TXT 40 mg/m <sup>2</sup> + G 1000 mg/m <sup>2</sup> / TXT 35 mg/m <sup>2</sup> + V 25 mg/m <sup>2</sup>
<b>TXT + paclitaxel</b>							
Germani <sup>49</sup> (2002)	26 <sup>a)</sup>	60 60 25	60 60 40	Cada sem (n=6) 2 sem dentro, 1 sem fuera (n=5) 2 sem dentro, 1 sem fuera (n=15)	Mucositis, diarrea, neutropenia	IR 68%; mediana de la duración de la respuesta 10 M; TTP (median) 9 M; mediana de la SG 14 M	TXT 25 + paclitaxel 40 d1, d8, q3w
<b>TXT + epirubicina</b>							
Wenzel <sup>50</sup> (2002)	NAQ: 20 <sup>a)</sup> Met: 13 <sup>a)</sup>	25-40	25-30	6 sem dentro, 1 sem fuera (max 4 ciclos for NAC)	Neutropenia Febril	NAQ: pCR 10%, RP 80% Met: IR 62%, TTP (mediana) 8.5 M, SG (mediana) 17.5 M	Epi 30 mg/m <sup>2</sup> + TXT 35 mg/m <sup>2</sup>
<b>TXT + pegilado liposomal de doxorrubiciна</b>							
Morabito <sup>51</sup> (2004)	57 <sup>a)</sup>	30	30-40	PLD d1 + TXT d2, d9, q3w	Eructo-disestesia Palmo-plantar, neutropenia febril	IR 59.5%; TTP (mediana) 9 M, SG at 18 M 62%	TXT 30 mg/m <sup>2</sup> + PLD 35 mg/m <sup>2</sup>
<b>TXT + vinorelbina</b>							
Cals <sup>52</sup> (2003)	24 <sup>a)</sup>	20-25	12.5-15	3 sem dentro, 1 sem fuera	Neutropenia, neutropenia febril	IR 43 % en la dosis recomendada ; TTP (mediana) 6.4 M; SG (mediana) 13.1 M	TXT 20 mg/m <sup>2</sup> + V 15 mg/m <sup>2</sup>
<b>TXT + capecitabina</b>							
Mackey <sup>53</sup> (2004)	26 <sup>a)</sup>	30-36	1200-1800 mg/m <sup>2</sup> BID	TXT: semanal Capecitabina: d1-d14, q3w Máximo 8 ciclos	Cambios ungueales, astenia, síndrome mano pie	IR 20%	TXT 30 mg/m <sup>2</sup> + Capecitabina 900mg/m <sup>2</sup> dos por día
<b>TXT + Bcl-2 desensibilizante (antisense) (G3139) en pacientes con tumores sólidos avanzados con sobreexpresión de Bcl-2</b>							
Marshall <sup>54</sup> (2004)	22(10 <sup>a)</sup>	35	14 or 5.9 mg/kg/day	TXT: 3 sem dentro, 1 sem fuera G3139: continuo (d1-d21)/intemítente (2-5 días antes del TXT)	MTD : no se alcanzó, fatiga, elevación de transaminasas con el esquema continuo	IR 16% en 12 pacientes que recibieron al menos 2 ciclos de la terapia	G3139 at 9 mg/kg/day + TXT 35 mg/m <sup>2</sup> en esquema intemítente

Abbreviations: Cm, Cáncer de mama; G, gemcitabina; Met, Cáncer de mama metastásico; NAQ, Quimioterapia neoadyuvante; NA, no alcanzó; ED, Estado de desempeño; IR, Índice de respuesta; TTP, tiempo hacia la progresión; SG, supervivencia global; pCR, Respuesta patológica completa; RP, Respuesta parcial; EE, enfermedad estable; TXT, docetaxel; V, vinorelbina.

a) No. de pacientes con cáncer de mama , b) Sin indicios de tumor invasivo residual