

TABLA 1. Historia y diagnóstico actual y severidad de la adicción al inicio. Características de los pacientes cuyos síntomas empeoraron

Característica	Primer estudio	Segundo estudio	
Historia de adicción y tratamiento			
Uso de drogas por 10 o + años	xxx	xxx	xxx
Uso + de 1 droga por 10 + años	xxx	xxx	
Arresto	xxx	xxx	xxx
Tratamiento previo por etilismo	-	xxx	
Tratamiento previo por adicción	xxx	xxx	
Diagnóstico actual			
Alcohol y droga	xxx	xxx	
Cocaína	xxx	xxx	
Psicosis	xxx	xxx	
Depresión	-	-	xxx
Personalidad	xxx	xxx	
Autocalificación del paciente			
Severidad de la adicción	xxx	xxx	
Necesidad de tratamiento	xxx	xxx	

xxx: denota características del paciente cuyos síntomas empeoraron

TABLA 2. Problemas psiquiátricos e interpersonales al inicio. Características de los pacientes cuyos síntomas empeoraron

Característica	Primer estudio	Segundo estudio	
Problemas psiquiátricos			
3 o + síntomas psiquiátricos graves	-	-	xxx
Alucinaciones por + 30 días	-	xxx	
Severidad psiquiátrica según autocalificación del paciente	xxx	xxx	
Necesidad de tratamiento psiquiátrico según autoevaluación del paciente	xxx	xxx	xxx
Tratamiento psiquiátrico previo	xxx	xxx	
Problemas interpersonales			
Conflicto severo (con + 3 personas)	xxx	xxx	xxx
Falta de amigos cercanos	xxx	xxx	

xxx: denota características del paciente cuyos síntomas empeoraron

TABLA 3. Factores de riesgo al inicio predictivos de pacientes que empeorarían. Deteriorados versus quienes permanecieron estables o mejoraron

Factor de riesgo	"Odds Ratio"	
Características demográficas		
Edad (18-39=1)	1.33	
No casado		1.13
Inestabilidad domiciliaria	1.36	
Problema de adicción		
10+ años adicción	1.34	
Tratamiento previo de etilismo	1.31	
Tratamiento previo de drogadicción	1.20	
Adicción a alcohol y droga	1.13	
Dependencia a cocaína		1.14
Severidad de la adicción	1.19	
Problemas psiquiátricos		
3+ síntomas severos	1.15	
Alucinaciones	1.36	
Internación psiquiátrica previa	1.16	

"Odds ratio" refleja la posibilidad que un paciente caracterizado por el factor de riesgo al inicio empeora sus síntomas en el seguimiento.