

Tabla 1. Criterios 2002, referidos a medicamentos psicotrópicos, modificados de los Criterios de Beers 1997

Criterios suprimidos de los Criterios 1997

Dependientes de la enfermedad

<i>Enfermedad</i>	<i>Medicación</i>
EPOC	Hipnóticos sedantes
Síncope o caídas	Benzodiazepinas de acción prolongada
Insomnio	Desipramina
Insomnio	ISRS

Criterios agregados a los Criterios 1997

Independientes de la enfermedad

Anfetaminas (exclusión de metilfenidato o anoréxicos)*
Anfetaminas y medicamentos anoréxicos
Fluoxetina diaria
Mesoridazina
Tioridazina

Dependientes de la enfermedad

<i>Enfermedad</i>	<i>Medicación</i>
Anorexia y desnutrición; deterioro cognitivo	Estimulantes del SNC
Anorexia y desnutrición	Fluoxetina
Deterioro cognitivo	Barbitúricos
EPOC; control inadecuado del estrés	Benzodiazepinas de acción prolongada
Depresión	Benzodiazepinas de acción prolongada
Obesidad	Olanzapina
Enfermedad de Parkinson	Antipsicóticos convencionales
Enfermedad de Parkinson	Tacrina
Alteración convulsiva	Bupropión
Síncope y caídas; control inadecuado del estrés	Antidepresivos tricíclicos (ATC, imipramina,
	doxepina, amitriptilina)
Síncope o caídas intermedia	Benzodiazepinas de acción corta o
Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética	ISRS

EPOC - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ISRS - Inibidores selectivos de la recaptación de serotonina; ATC – Antidepresivos tricíclicos; SNC – Sistema nervioso central

* Estos grupos difieren en el motivo por el que se incluyen como medicamentos potencialmente inadecuados.