

Tabla 4.- distribución de pacientes en Adjusted Clinical Groups (ADG). Comparación ente los datos de de historias clínicas informatizadas y dos registros previos de morbilidad atendida.

ADG	Descripción	Historias clínicas informatizadas			Registro de morbilidad atendida (2.003)			Registro de morbilidad atendida (1.995)		
		n=669.773	%	(IC del 95%)	n=84.136	%	(IC del 95%)	n=12.881	%	(IC del 95%)
1	Patología autolimitada leve	92.654	12,65%	(12,57 - 12,73)	9.730	11,56%	(11,34 - 11,78)	1.318	10,23%	(9,7 - 10,77)
2	Infecciones autolimitadas leves	221.251	30,21%	(30,1 - 30,32)	21.265	25,27%	(24,97 - 25,57)	4.422	34,33%	(33,49 - 35,17)
3	Patología autolimitada grave	9.464	1,29%	(1,26 - 1,32)	911	1,08%	(1,01 - 1,15)	127	0,99%	(0,81 - 1,16)
4	Infecciones autolimitadas graves	14.046	1,92%	(1,89 - 1,95)	1.075	1,28%	(1,2 - 1,36)	262	2,03%	(1,79 - 2,28)
5	Alergias	19.561	2,67%	(2,63 - 2,71)	1.842	2,19%	(2,09 - 2,29)	346	2,69%	(2,4 - 2,97)
6	Asma	19.953	2,72%	(2,68 - 2,76)	2.119	2,52%	(2,41 - 2,63)	479	3,72%	(3,39 - 4,05)
7	Patología recurrente moderada	86.979	11,88%	(11,8 - 11,96)	9.519	11,31%	(11,09 - 11,53)	1.485	11,53%	(10,97 - 12,09)
8	P. infecciosa recurrente moderada.	66.301	9,05%	(8,98 - 9,12)	6.762	8,04%	(7,85 - 8,23)	1.216	9,44%	(8,93 - 9,96)
9	Patología recurrente progresiva	8.830	1,21%	(1,18 - 1,24)	897	1,07%	(1 - 1,14)	122	0,95%	(0,78 - 1,12)
10	P. crónica medica estable	147.228	20,10%	(20,01 - 20,19)	16.755	19,91%	(19,63 - 20,19)	2.381	18,48%	(17,8 - 19,17)
11	P. crónica medica inestable	41.547	5,67%	(5,62 - 5,72)	4.476	5,32%	(5,17 - 5,47)	881	6,84%	(6,39 - 7,28)
12	P. crónica estable propia de especialista: Ortopedia	10.076	1,38%	(1,35 - 1,41)	709	0,84%	(0,78 - 0,9)	165	1,28%	(1,08 - 1,48)
13	P. crónica estable propia de especialista: ORL	5.894	0,80%	(0,78 - 0,82)	668	0,79%	(0,73 - 0,85)	61	0,47%	(0,35 - 0,59)
14	P. crónica estable propia de especialista: Oftalmología	10.612	1,45%	(1,42 - 1,48)	753	0,89%	(0,83 - 0,95)	172	1,34%	(1,13 - 1,54)
15	Actualmente no utilizado									
16	P. crónica inestable propia de especialista: Ortopedia	3.269	0,45%	(0,43 - 0,47)	327	0,39%	(0,35 - 0,43)	92	0,71%	(0,57 - 0,86)
17	P. crónica inestable propia de especialista: ORL	628	0,09%	(0,08 - 0,1)	65	0,08%	(0,06 - 0,1)	5	0,04%	(0 - 0,07)
18	P. crónica inestable propia de especialista: Oftalmología	6.887	0,94%	(0,92 - 0,96)	1.000	1,19%	(1,12 - 1,26)	121	0,94%	(0,77 - 1,11)
19	Actualmente no utilizado									
20	P. dermatológica	35.639	4,87%	(4,82 - 4,92)	4.207	5,00%	(4,85 - 5,15)	711	5,52%	(5,12 - 5,92)
21	Lesiones/Efectos adversos: Leves	30.524	4,17%	(4,12 - 4,22)	3.715	4,42%	(4,28 - 4,56)	614	4,77%	(4,39 - 5,14)
22	Lesiones/Efectos adversos: Graves	20.307	2,77%	(2,73 - 2,81)	2.110	2,51%	(2,4 - 2,62)	400	3,11%	(2,8 - 3,41)
23	P. Psicosocial: Autolimitada, leve	21.899	2,99%	(2,95 - 3,03)	2.461	2,93%	(2,81 - 3,05)	743	5,77%	(5,36 - 6,18)
24	P. Psicosocial: recurrente o persistente, estable	36.192	4,94%	(4,89 - 4,99)	3.483	4,14%	(4 - 4,28)	681	5,29%	(4,89 - 5,68)
25	P. Psicosocial: recurrente o persistente, inestable	8.617	1,18%	(1,15 - 1,21)	829	0,99%	(0,92 - 1,06)	168	1,30%	(1,1 - 1,5)
26	Signos/Síntomas: Leves	128.417	17,53%	(17,44 - 17,62)	12.374	14,71%	(14,47 - 14,95)	1.977	15,35%	(14,71 - 15,98)
27	Patología autolimitada leve	114.605	15,65%	(15,57 - 15,73)	13.252	15,75%	(15,5 - 16)	1.898	14,73%	(14,11 - 15,36)
28	Infecciones autolimitadas leves	50.677	6,92%	(6,86 - 6,98)	5.697	6,77%	(6,6 - 6,94)	938	7,28%	(6,82 - 7,74)
29	Patología autolimitada grave	44.807	6,12%	(6,06 - 6,18)	4.709	5,60%	(5,44 - 5,76)	824	6,40%	(5,97 - 6,83)
30	Infecciones autolimitadas graves	9.688	1,32%	(1,29 - 1,35)	837	0,99%	(0,92 - 1,06)	476	3,70%	(3,36 - 4,03)
31	Alergias	320.500	43,76%	(43,64 - 43,88)	28.495	33,87%	(33,54 - 34,2)	2.054	15,95%	(15,3 - 16,59)
32	Asma	7.061	0,96%	(0,94 - 0,98)	788	0,94%	(0,87 - 1,01)	147	1,14%	(0,95 - 1,33)
33	Patología recurrente moderada	6.589	0,90%	(0,88 - 0,92)	615	0,73%	(0,67 - 0,79)	56	0,43%	(0,32 - 0,55)
34	P. infecciosa recurrente moderada.	14.166	1,93%	(1,9 - 1,96)	1.902	2,26%	(2,16 - 2,36)	319	2,48%	(2,2 - 2,75)

Un paciente puede estar incluido en más de un ADG por haber presentado múltiples diagnósticos.