

Tabla 1. Porcentaje de cambio anual de las tasas de mortalidad (periodo 1983-2002) e incidencia (periodo 1983-1997) de la patología hepática en Catalunya.

MORTALIDAD	1983-1984				1996-1997				2001-2002				PCA		PCA	
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	N	TMAE	N	TMAE	N	TMAE	N	TMAE	N	TMAE	N	TMAE	PCA	IC 95%	PCA	IC 95%
Cirrosis hepática	4.808	25,2	2.587	10,4	-	-	1.344	13,6	728	5,3	-4,1	-4,3 ÷ -3,8*	-3,8	-4,2 ÷ -3,4*		
CH global	1.779	8,9	1.276	4,3	-	-	1.002	8,7	46	3,0	0,0	-0,4 ÷ 0,4	-1,9	-2,5 ÷ -1,4*		
Carcinoma hepatocelular	736	3,7	352	1,3	-	-	714	6,2	326	1,9	3,2	2,7 ÷ 3,8*	3,2	2,3 ÷ 4,1*		
T. vías biliares intrahepáticas	34	0,2	28	0,1	-	-	108	0,9	96	0,6	10,7	8,5 ÷ 13,1*	11,6	8,9 ÷ 14,5*		
CH inespecífico	1.009	4,9	896	2,9	-	-	180	1,5	124	0,6	-7,2	-7,9 ÷ -6,6*	-9,7	-10,6 ÷ -8,8*		
INCIDENCIA																
CH global	92	4,7	41	1,7	161	6,7	88	2,8	-	-	3,9	1,09 ÷ 6,9*	3,4	-0,1 ÷ 7,1		
Carcinoma hepatocelular	45	2,4	10	0,4	91	4,2	38	1,4	-	-	6,3	2,5 ÷ 10,4*	13,6	5,9 ÷ 21,7*		
T. vías biliares intrahepáticas	8	0,4	8	0,4	10	0,4	3	0,1	-	-	-1,1	-9,9 ÷ 8,4	-10,8	-19,8 ÷ -0,7*		
CH inespecífico	39	1,9	23	0,9	60	2,1	47	1,4	-	-	1,1	-3,4 ÷ 5,8	3,9	-2,1 ÷ 10,2		

CH: Cáncer hepático; **TMAE:** Tasa de mortalidad ajustada por edad (población mundial); **TIAE:** Tasa de incidencia ajustada por edad (población mundial);

N: número de casos; **PCA:** porcentaje de cambio anual (calculado a partir del modelo Edad-Tendencia); **IC 95%:** Intervalo de confianza del 95% del APC; *: p < 0,05.