

**Tabla I.-** Concentración sérica de esteroides sexuales y volúmenes ováricos en nodrizas normales (NN) y nodrizas SOP (NSOP) en la 4ª y 8ª semana post parto y 8 semanas después del destete. (Adaptado de Sir-Petermann y col. Hum Reprod. 2002; 17: 2573 – 2579)

	<b>Testosterona (ng/ml)</b>	<b>Androstenediona (ng/ml)</b>	<b>Estradiol (pg/ml)</b>	<b>Volumen Ovárico (cm<sup>3</sup>)</b>
<b>4ª semana</b>				
NN	0.22 (0.10 – 0.34)	0.83 (0.20 – 1.28)	14.95 (10.0 – 34.0)	5.28 (3.3 – 7.4)
NSOP	0.37 (0.1 – 1.26)	2.42 (0.5 – 8.0)	19.36 (10.0 – 35.8)	9.59 <sup>c</sup> (3.85 – 15.6)
<b>8ª semana</b>				
NN	0.17 (0.10 – 0.35)	0.59 (0.40 – 0.90)	30.56 (10.1 – 95.0)	5.74 (4.40 – 7.70)
NSOP	0.36 (0.10 – 0.98)	2.34 <sup>c</sup> (0.4 – 9.89)	15.06 (10.0 – 44.0)	9.84 <sup>c</sup> (6.10 – 18.05)
<b>Destete</b>				
NN	0.28 (0.25 – 0.32)	1.22 <sup>b</sup> (0.71 – 1.81)	58.0 <sup>a</sup> (20.0 – 140.0)	5.50 (4.7 – 7.2)
NSOP	0.44 (0.14 – 0.94)	2.59 <sup>c</sup> (0.76 – 6.7)	15.6 <sup>c</sup> (10.0 – 48.0)	9.94 <sup>c</sup> (5.9 – 23.1)

Valores expresados en promedio y rango

<sup>a</sup> p < 0.05 entre 4ª semana post parto y 8 semanas después del destete

<sup>b</sup> p < 0.05 entre la 8ª semana post parto y 8 semanas después del destete

<sup>c</sup> p < 0.05 entre NN y NSOP.