

Tabla 1 Características demográficas y evaluaciones clínicas

	Esquizofrenia positiva mSANS < 12		Esquizofrenia negativa mSANS > 12		Prueba ómnibus estadística
	<u>Grupo A</u> MADRS < 6	<u>Grupo B</u> MADRS > 12	<u>Grupo C</u> MADRS < 6	<u>Grupo D</u> MADRS >12	
N	10	10	10	10	
Edad	33.7 años (SD: 9.2)	36.2 (SD: 13)	41.1 (SD: 7.4)	43.4 (SD: 9)	F=2 df=3 p=0.13
Porcentaje de hombres (número)	70% (7)	70% (7)	70% (7)	70% (7)	
Educación (en años)	12.7 (SD: 1.3)	11.6 (SD: 2.8)	10.6 (SD: 1.5)	11.5 (SD: 1.7)	F=2 df=3 p=0.13
Raza / Grupo étnico Negro/Blanco/Hispano/Otros	7/3//0	7/2/1/0	7/1/0/2	7/2/1/0	
Edad de los primeros síntomas	20 (SD: 8)	17 (SD: 5)	21 (SD: 5)	17 (SD: 5)	F=1.2 df=3 p=0.32
Edad de la primera hospitalización	21 (SD: 8)	18 (SD: 6)	22 (SD: 5)	22 (SD: 11)	F=0.6 df=3 p=0.64
Duración de la enfermedad (en años)	14 (SD: 8)	19 (SD: 12)	19 (SD: 8)	25 (SD: 10)	F=2.7 df=3 p=0.06
Cantidad de meses que pasó en hospitales estatales	26 (SD: 23)	79 (SD: 108)	74 (SD: 68)	80 (SD: 78)	F=1.2 df=3 p=0.34
Subtipos diagnósticos	Paranoide 4 Indiferenciada: 3 Desorganizada: 1 Residual: 2	Paranoide: 6 Indiferenciada: 4 Desorganizada: 0 Residual:0	Paranoide: 6 Indiferenciada: 4 Desorganizada: 0 Residual:0	Paranoide: 7 Indiferenciada: 3 Desorganizada: 0 Residual: 0	
Fármacos antipsicóticos	Primera generación: 0 Segunda generación: 10 Combinados: 0	Primera generación: 1 Segunda generación: 6 Combinados: 3	Primera generación: 1 Segunda generación: 7 Combinados: 2	Primera generación: 0 Segunda generación: 8 Combinados: 2	
Fármacos antidepresivos	N=0	N=2	N=0	N=4	
Estabilizadores del estado de ánimo	N=5	N=8	N=4	N=1	

MADRS: Montgomery-Ásberg Depression Rating Scale, Escala de evaluación de depresión de Montgomery-Asberg

mSANS: modified Scale for the Assessment of Negative Symptoms, Escala de evaluación de síntomas negativos modificada