

Tabla 2 Evaluaciones clínicas

	Esquizofrenia positiva mSANS < 12		Esquizofrenia negativa mSANS >12		Prueba ómnibus (ANOVA) o Regresión logística(GENMOD)	Comparaciones apareadas
	<u>Grupo A</u> MADRS < 6	<u>Grupo B</u> MADRS > 12	<u>Grupo C</u> MADRS < 6	<u>Grupo D</u> MADRS >12		
Puntajes en la MADRS	1.4 (SD: 2)	16.7 (SD: 4.2)	2.9 (SD: 2)	17 (SD: 5.5)	F=52 df=3 p<0.0001	A, B < C, D
Puntaje total de la SANS	4.4 (SD: 1.8)	8.5 (SD: 2.6)	17.7 (SD: 2.9)	16.5 (SD: 2.3)	F=69 df=3 p<0.0001	A < B < C, D
Puntajes de la escala de Simpson y Angus	0.4 (SD: 0.7)	2.7 (SD: 4.0)	1.3 (SD: 3.4)	0.8 (SD: 1.3)	F=1.35 df=3 p= 0.27	
Puntajes totales de la MASS	25.9 (SD: 5)	22.6 (SD: 3.8)	14.5 (SD: 5)	15.7 (SD: 3.7)	Depresión: p=0.43 NS: p<0.0001 Interacción: p=0.10	A, B > C, D
Puntajes de la entrevista de la MASS	11.7 (SD: 3.6)	10.3 (SD: 3.1)	7.7 (SD: 2.9)	7.3 (SD: 2.5)	Depresión: p=0.33 NS: p=0.0004 Interacción: p=0.59	A > C, D B > D
Puntajes de la conducta unitaria de la MASS	14.2 (SD: 1.9)	12.3 (SD: 1.4)	6.8 (SD: 2.7)	8.4 (SD: 2.8)	Depresión: p=0.82 NS: p<0.0001 Interacción: p=0.01	A > B > C, D
Puntajes totales de la PANSS	60 (SD: 13.5)	83 (SD: 11)	79 (SD: 7)	98 (SD: 11)	Depresión: p<0.0001 NS: p<0.0001 Interacción: p=0.52	A < B, C < D
Puntajes de los síntomas positivos de la PANSS	17.3 (SD: 6.8)	21.5 (SD: 4.3)	13.8 (SD: 5.6)	18.9 (SD: 4.4)	Depresión: p=0.006 NS: p=0.06 Interacción: p=0.78	C < B, D
Puntajes de la GAS	39.3 (SD: 3.8)	36.3 (SD: 3.2)	32.5 (SD: 3)	33.1 (SD: 4.4)	Depresión: p=0.28 NS: p<0.0001 Interacción: p=0.11	A > C, D B > C

MADRS: Montgomery-Ásberg Depression Rating Scale, Escalade evaluación de depresión de Montgomery-Asberg

mSANS: modified Scale for the Assessment of Negative Symptoms, Escala de evaluación de síntomas negativos modificada

MASS: Motor-Affective-Social Scale, Escala motora-afectiva-social

PANSS: Positive and Negative Symptom Scale, Escala de síntomas positivos y negativos

GAS: Global Assessment Scale, Escala de evaluación global

NS: síntomas negativos