

	T0	T1	T2		T3		T4	P para las diferencias entre grupos en	
		Fase de Ajuste	grupo AM (ac. de maíz)	grupo MA (mezcla de ac.)	grupo MA (mezcla de ac.)	grupo AM (ac. de maíz)		T2	T3
Colesterol pl (mmol/l)	4.3 ± 0.9	4.9 ± 0.9	4.3 ± 0.7	4.5 ± 0.7	4.6 ± 0.7	3.9 ± 0.8	4.4 ± 0.9	n.s.	p<0.01
Triglicéridos pl (mmol/l)	1.2 ± 0.4	1.1 ± 0.4	0.8 ± 0.3	1.1 ± 0.4	0.9 ± 0.4	0.8 ± 0.3	1.1 ± 0.4	p<0.05	n.s.
VLDL colesterol (mmol/l)	0.89 ± 0.13	0.83 ± 0.08	0.71 ± 0.08	0.86 ± 0.19	0.79 ± 0.12	0.77 ± 0.14	0.89 ± 0.13	p<0.01	n.s.
VLDL triglicéridos (mmol/l)	0.40 ± 0.12	0.35 ± 0.08	0.25 ± 0.09	0.35 ± 0.09	0.27 ± 0.06	0.31 ± 0.12	0.40 ± 0.12	p<0.01	n.s.
LDL colesterol (mmol/l)	3.66 ± 1.1	3.91 ± 0.87	3.06 ± 0.88	3.88 ± 0.74	3.25 ± 0.91	3.34 ± 1.01	3.71 ± 1.08	p<0.01	n.s.
HDL colesterol (mmol/l)	0.86 ± 0.20	0.89 ± 0.19	0.92 ± 0.13	0.94 ± 0.16	0.95 ± 0.13	0.98 ± 0.14	0.93 ± 0.15	n.s.	n.s.

Tabla 4: Niveles plasmáticos (pl) y de LDL de tocoferoles, colesterol y triglicéridos analizados al inicio (T0), luego de la dieta de ajuste (T1), de la dieta con aceite (ac.) de maíz (AM), de la dieta con mezcla de aceites (MA) (T2), del período de entrecruzamiento (T3) y 5 semanas después de la intervención (T4) (20)