

Anticipos SNC

Los artículos de Anticipos han sido escogidos por la dirección médica el día anterior a la culminación de la presente edición. Aquí sólo adelantamos los resúmenes de sus conclusiones.

Las versiones completas, redactadas por SIIC, integrarán futuros Trabajos Distinguidos en la medida en que sean seleccionadas por el Comité de Expertos de la especialidad.

Hallazgos en el gen del angiotensinógeno

Se observaron frecuencias más altas de alelos y genotipos en el punto de mutación 174 del angiotensinógeno, hecho que no había sido informado previamente. El análisis sugiere que el gen del angiotensinógeno juega un papel importante en la nefropatía diabética.

[Journal of the Chinese Medical Association]

Sostén emocional para madres en la UCI neonatal

La colaboración ofrecida por mujeres que integran un programa de ayuda telefónica reduce en las madres de niños prematuros el estrés y la ansiedad.

[Canadian Medical Association Journal]

Receptores estrogénicos y osteoporosis

Las mujeres posmenopáusicas cuyo genotipo para receptores estrogénicos es del tipo pp y XX tienen menor probabilidad de desarrollar osteoporosis que aquellas que presentan el haplotipo Px.

[Chinese Medical Journal]

Confiabilidad del extendido cervical convencional

El extendido cervical convencional es más confiable y con menores falsos positivos y falsos negativos que la citología de monocapa para el testeo del cáncer de cuello uterino.

[British Medical Journal]

Prevención del parto pretérmino mediante pesarios

La detección de cuello uterino corto por ecografía transvaginal antes de las 28 semanas de gestación es un factor predictivo de parto pretérmino. La colocación de un pesario vaginal permite prevenir esta complicación.

[Journal of Perinatal Medicine]

Resistencia a la insulina en el ovario poliquístico

La hiperinsulinemia se asocia con aumento de la homocisteína en el plasma en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Este hallazgo tendría importantes consecuencias en la salud reproductiva y el riesgo cardiovascular.

[Human Reproduction]

Complicaciones en la hiperestimulación ovárica

El diagnóstico y el tratamiento adecuado de las manifestaciones del síndrome de hiperestimulación ovárica, así como la oportuna identificación de los factores de riesgo, favorecen un pronóstico satisfactorio.

[Gynecological Endocrinology]

Estudio del cáncer mamario con resonancia magnética

La resonancia nuclear magnética mostró mayor sensibilidad en el estudio de cáncer mamario que la tomografía de emisión de positrones ya que permite mejor diagnóstico en los carcinomas pequeños.

[The Breast]

Valor de los exámenes urinarios para detectar ETS

Las pruebas urinarias para el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual provocadas por Chlamydia trachomatis son un buen complemento, pero no reemplazan a los hisopados de cuello y uretra.

[Clinical Microbiology and Infection]

Rastreo sistemático del cáncer de mama y sobrevida

La sobrevida a los 5 años de mujeres con cáncer de mama detectado en programas de pesquisa fue superior a los casos diagnosticados por la aparición de sintomatología.

[Asian Journal of Surgery]

Evaluación del riesgo de cáncer de mama familiar

Tener historia de cáncer de mama en la familia incrementa la probabilidad de padecerlo. El riesgo aumenta en caso de pariente cercana con tumor diagnosticado antes de los cuarenta años, o más de una familiar de primer grado con la enfermedad.

[Journal of the National Cancer Institute]

Detección de la trisomía 18 en gestantes

La pesquisa del síndrome de Down y de cardiopatías congénitas puede ser realizada mediante la medición de la translucidez nucal en el primer trimestre combinada con ecocardiografía fetal entre las semanas 16 a 18.

[Prenatal Diagnosis]

Seguimiento de lesiones mamarias benignas

La pesquisa del cáncer de mama mediante la mamografía disminuye la mortalidad por cáncer de mama. Las lesiones descritas como probablemente benignas rara vez evolucionan a un tumor.

[Journal of the National Cancer Institute]

Inducción del trabajo de parto con corticoides

Alrededor de un 10% de los embarazos se prolongan más de 41 semanas. La inyección intramuscular de corticoides acorta el intervalo de tiempo entre la inducción del trabajo de parto y su fase activa.

[Journal of Perinatal Medicine]

Para ampliar la información de Anticipos aguarde la próxima edición de esta serie editorial o comuníquese con el Departamento de Relaciones Científicas de SIIC <relacion@siicsalud.com>, tel: +54 11 4342 4901.

Anticipos SNC

Los artículos de Anticipos han sido escogidos por la dirección médica el día anterior a la culminación de la presente edición. Aquí sólo adelantamos los resúmenes de sus conclusiones.

Las versiones completas, redactadas por SIIC, integrarán futuros Trabajos Distinguidos en la medida en que sean seleccionadas por el Comité de Expertos de la especialidad.

El número de folículos antrales en mujeres sanas

El número de folículos antrales es el parámetro que mejor se correlaciona con la edad reproductiva en mujeres sanas y fértiles. Los niveles de estradiol e inhibina B luego de la estimulación con GnRH también son adecuados.

[Human Reproduction]

Detección de infecciones de transmisión sexual

*Los análisis urinarios para el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual provocadas por *Clamidia trachomatis* son un buen complemento, pero no reemplazan los hisopados de cuello y uretra.*

[Clinical Microbiology and Infection]