

Dificultades del auxilio en la emergencia psiquiátrica aguda

Buenos Aires - Es imprescindible encontrar respuestas que posibiliten el mejor cuidado del paciente en la emergencia, así como también condiciones que permitan a los especialistas desempeñar su tarea en un marco de seguridad y respeto por el trabajo profesional [**Alceon**].

El intento de aproximación a la problemática de los auxilios en la emergencia psiquiátrica lleva a la necesidad de identificar las dificultades que plantea esta situación y las condiciones en que se desarrolla la actividad profesional, a fin de valorarlas adecuadamente e introducir los cambios pertinentes.

Según un estudio realizado por expertos del Hospital de Emergencias Psiquiátricas «Torcuato de Alvear», de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha producido un notable incremento de los auxilios solicitados por el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) y un cambio en sus características (mayor violencia). Dicha modificación, tanto en la cantidad como en la calidad de las intervenciones, se complica frente a la creciente escasez de recursos (falta de camas disponibles, que muchas veces desemboca en la solicitud de intervención judicial; ausencia de personal especializado que acompañe al médico en el auxilio; falta de personal capacitado que colabore en la contención física de pacientes violentos o con crisis de excitación psicomotriz).

La urgencia ambulatoria marca una situación de crisis. En ella, el quiebre individual, familiar y social ubica al profesional frente a un paciente incapaz de cuidarse por sí mismo. Debido a que en la urgencia se despliega todo tipo de fenómenos (psíquicos, vinculares y sociales), queda instalado un panorama riesgoso para la integridad física y emocional de los intervinientes, en el que resulta conveniente evitar un deterioro adicional al del propio motivo del auxilio. Por esta razón, la primera circunstancia que se debería evaluar es la seguridad de los pacientes y los médicos. En la actualidad, el incremento de la violencia actúa complejizando aún más la situación, con el frecuente agregado de demoras en la colaboración policial.

En opinión de los autores, la suma de dificultades asociada con



Otto Dix, «Retrato del Dr. Hans Koch», óleo sobre tela, 100,5x90 cm, 1921.

En la urgencia psiquiátrica queda planteada una situación de riesgo para la integridad física y emocional de los intervinientes, de difícil resolución.

este tipo de auxilio lleva muchas veces al médico general a solicitar la derivación en lugar de una interconsulta.

(Continúa en página 24)



Expertos Invitados

■ Artículos originales [especiales para SIIC]

Evolución clínica de la artritis reumatoidea

Dra. OILI KAIPIAINEN-SEPPÄNEN

Kuopio, Finlandia - La amiloidosis secundaria (AS) es una complicación seria de la artritis reumatoidea (AR). La prevalencia de AR en Finlandia es cercana al 0.8%. La incidencia a 15 años de AS en pacientes con AR fue del 11%.

Ausencia de ritmo circadiano endógeno en la presión sanguínea...

Dr. HANS VAN DONGEN

Filadelfia, EE.UU. - El ritmo circadiano (periodicidad cercana a 24 horas) en la presión sanguínea es clínicamente importante dada su relación temporal con el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular isquémico...

Apendicitis: nuevas pruebas diagnósticas, ¿los mismos...?

Dr. CHARLES D DOUGLAS

Newcastle, Australia - La apendicitis es una patología potencialmente letal. Sin tratamiento, el apéndice puede perforarse y en consecuencia la morbilidad aumenta en forma considerable.

Utilidad de los marcadores genéticos para predecir la diabetes...

Dr. PETRI KULMALA

Oulu, Finlandia - Debido a que los genes son características hereditarias estables de un individuo, el estudio genético constituye una excelente posibilidad para identificar a los que tienen riesgo de padecer una enfermedad...

(más artículos, págs. 12-22)



Hallazgos Científicos

■ Iberoamérica

Influencia del medio en la infertilidad masculina

[Human Reproduction]

Fracturas vertebrales por osteoporosis durante el embarazo

[Nutrition].

(más informes, págs. 23-28)

■ Resto del Mundo

Duración de la profilaxis del tromboembolismo venoso...

[The Lancet].

Identifican el gen responsable del síndrome de Wolff Parkinson...

[The New England Journal of Medicine].

(más informes, págs. 30-36)



Temas de la Medicina

Conducir después de una taquiarritmia grave

[The New England Journal of Medicine].

Valoración del dolor en la población pediátrica

[Pain].

(más informes, págs. 37-50)