

	Página	Página
Expertos invitados		
■ Revisiones		
Revisión sobre carcinoma vesical de células pequeñas		
El infrecuente carcinoma vesical de células pequeñas requiere técnicas inmunohistoquímicas para su confirmación histopatológica. Los regímenes quimioterapéuticos complementarios basados en el cisplatino suponen un avance en términos pronósticos.		
La sospecha clínica inicial como elemento clave para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar		
El establecimiento de una estimación de la probabilidad de padecer tromboembolismo pulmonar permite simplificar los algoritmos diagnósticos y racionalizar el uso de las pruebas complementarias.		
Patogenia, clínica y tratamiento del síndrome de anorexia-caquexia asociado al cáncer		
El síndrome de anorexia-caquexia se observa frecuentemente en las personas con cáncer. Es importante reconocer y tratar este síndrome lo más tempranamente posible para prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida.		
Evaluación del embarazo luego de la cirugía bariátrica de la obesidad		
El embarazo de las mujeres con obesidad mórbida se asocia a numerosas complicaciones gestacionales y perinatales. Aquellas que fueron sometidas a cirugía bariátrica pueden cursar embarazos como los de quienes tienen un índice de masa corporal dentro de lo normal.		
Prueba del aliento con ¹³C-urea para el diagnóstico de la infección por <i>H. pylori</i> mediante espectrometría de masa y espectrofotometría de infrarrojos		
La prueba del aliento con urea tiene una exactitud mayor del 90%, por lo que es superior al diagnóstico basado en el análisis de la muestra obtenida por biopsia.		
■ Artículos originales		
Analizan los factores asociados con trastornos alimentarios en la adolescencia		
Las puntuaciones en el Eating Disorders Inventory difieren en función de la pertenencia al grupo de adolescentes con autoconcepto físico bajo, medio o alto, de la práctica deportiva, de la edad (12-14 versus 15-18 años) y del índice de masa corporal.		
Características del tratamiento anticoagulante oral en la fibrilación auricular crónica de alto riesgo		
El uso del tratamiento anticoagulante oral en pacientes con fibrilación auricular y alto riesgo de ictus se inicia con retraso y la escasez de eventos dificulta la elaboración de conclusiones en la descentralización de su seguimiento.		
Tamizaje serológico de anticuerpos anti-<i>Trypanosoma cruzi</i> en bancos de sangre		
Para el tamizaje en bancos de sangre, se podría comenzar a pensar en la posibilidad de la utilización, como única prueba, de un método de enzimoimmunoensayo mejorado que presente mayor sensibilidad y especificidad.		
■ Entrevistas a expertos		
Análisis epidemiológico de las causas de muerte súbita en México		
Enrique Asencio, México DF, México		
■ Aspectos de la esterilidad masculina en pacientes que consumen esteroides anabolizantes		
Luis de la Torre Abril, Valencia, España	481	
■ Papelnet SIIC	484-486	
■ Crónicas de autores		
Diagnóstico de las micosis de piel, pelos y uñas		
Silvana Mestroni, La Plata, Argentina	488	
Proceso de elaboración de la vía clínica del carcinoma colorrectal		
Víctor Soria, Murcia, España	488	
Estudio de 420 casos de leishmaniose tegumentar americana		
Roberto Querido Name, Brasilia, Brasil	490	
Vitílico: comparação entre áreas curetadas e enxertadas através de contagem de melanócitos e PCR de RNAm de tirosinase		
Carlos D. Apparecida Santos Machado Filho, Santo André, Brasil	490	
■ Casos clínicos		
Diagnóstico mediante imágenes en la miocardiopatía hipertrófica apical sin aneurisma		
Miguel Angel Ulecia Martínez, Granada, España	490	
Novedades seleccionadas		
■ Epidemiología		
La exposición excesiva a la televisión se asocia con sobrepeso en preescolares		
Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine	496	
■ Clínica		
Los ronquidos podrían ser un factor independiente en los trastornos del sueño		
Otolaryngology-Head and Neck Surgery	498	
Relación de las adenoides con la sensibilización mediada por IgE en niños atópicos		
Acta Oto-Laryngologica	498	
Inadecuada información a los pacientes acerca del ayuno prequirúrgico		
Anaesthesia and Intensive Care	500	
■ Diagnóstico		
Importancia de la calidad de vida previa en la evolución del trasplante de células madre		
Bone Marrow Transplantation	502	
■ Tratamiento		
Las complicaciones intracraneales de la sinusitis pediátrica requieren con frecuencia craneotomía		
Otolaryngology-Head and Neck Surgery	504	
■ Cartas al editor	506	
■ Instrucciones para autores	507	
■ Salud al margen	510	