

	Página		Página
<b>Índice</b>			
<b>Noticias Propias</b>	131		
<b>■ SIIC Informa</b>	132		
<b>Expertos Invitados</b>			
<b>■ Revisiones</b>			
<b>Antiagregación, diabetes y prevención cardiovascular primaria. revisión crítica de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes</b>			
<i>Este trabajo es una revisión actualizada de las pruebas, sobre las que, en definitiva, deberían basarse las recomendaciones.</i>	134		
<b>El suplemento de ácidos grasos omega-3 sería útil para prevenir y tratar la depresión en la diabetes mellitus tipo 2</b>			
<i>El suplemento de ácidos grasos poliinsaturados omega-3, en particular el de ácido eicosapentaenoico, puede ser una herramienta segura y útil para reducir la incidencia de depresión y tratarla en la diabetes tipo 2. A partir de estas conclusiones, se justifica realizar otros estudios para evaluar estas hipótesis en pacientes con diabetes tipo 2.</i>	138		
<b>Utilidad del electrocardiograma obtenido a través de una vía central en pacientes críticos</b>			
<i>En este trabajo se realiza una revisión de los distintos métodos electrocardiográficos disponibles para magnificar la actividad auricular con especial atención en el electrocardiograma intravascular.</i>	146		
<b>Terapia de reemplazo hormonal y riesgo de enfermedades neurodegenerativas</b>			
<i>Existen limitaciones importantes en la investigación actual, pero también razones convincentes para volver a examinar el modo en que algunas formas de TRH pueden ayudar a preservar las capacidades cognitivas en mujeres posmenopáusicas y evitar las enfermedades neurodegenerativas.</i>	148		
<b>Epidemiología e controle da leishmaniose visceral no estado de Pernambuco, Brasil: situação atual e perspectivas</b>			
<i>Nas últimas décadas houve uma notável expansão da distribuição geográfica da leishmaniose visceral em Pernambuco. É preciso encorajar novos estudos sobre a epidemiologia e controle da doença nesse estado.</i>	156		
<b>■ Originales</b>			
<b>Hallazgos neuroendocrinos en el síndrome de ingesta nocturna</b>			
<i>El análisis polisomnográfico, neuroendocrino y del ritmo circadiano de los factores dietéticos, hormonales y del sueño arroja luz sobre la fisiopatología subyacente del síndrome de ingesta nocturna y apoya su conceptualización como un trastorno de la alimentación de fase retrasada con cambios hormonales circadianos asociados.</i>	160		
<b>Anticoagulación en pacientes menores de 75 años con fibrilación auricular</b>			
<i>En la fibrilación auricular no valular la anticoagulación oral, instaurada de acuerdo con las recomendaciones de las sociedades científicas, es efectiva y segura en la práctica clínica diaria para pacientes menores de 75 años.</i>	164		
<b>Incrementos continuos de las hospitalizaciones debidas a angioedema</b>			
<i>En la actualidad, el angioedema es el trastorno alérgico agudo no asmático más frecuente que conduce a la hospitalización en el estado de Nueva York. Los incrementos continuos de las hospitalizaciones por angioedema pueden estar relacionados con el uso mayor de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.</i>	168		
		<b>Efectos antioxidantes de una mezcla de principios activos de origen natural con actividad potencial en el tratamiento del vitiligo</b>	
		<i>Parece probable que el efecto observado en la clínica para esta combinación de principios activos naturales esté mediado por la mejora del sistema redox del entorno del melanocito.</i>	173
		<b>Conveniencia de la cirugía ambulatoria en proctología. Análisis retrospectivo de 1 031 casos</b>	
		<i>Los resultados obtenidos demuestran que los procedimientos ambulatorios en proctología pueden ser realizados de forma sistemática y segura, a bajo costo, con pocas complicaciones y ventajas en relación con los procedimientos realizados en régimen de internación hospitalaria.</i>	177
		<b>Obesidad y mortalidad en hombres según el estado de su enfermedad coronaria</b>	
		<i>Este estudio confirmó hallazgos anteriores de un aumento del riesgo de mortalidad por todas las causas, de enfermedad cardiovascular y de mortalidad por enfermedad coronaria en hombres independientemente de que padecieran o no enfermedad coronaria. Los hombres de edad media deben evitar el sobrepeso y la obesidad.</i>	183
		<b>■ Entrevistas a Expertos</b>	
		<b>Síndrome metabólico en adultos de 20 a 40 años en una comunidad rural mexicana</b>	
		<i>La prevalencia del síndrome metabólico en México es de las más altas informadas a nivel mundial y actualmente es el principal problema de salud pública en ese país.</i>	189
		<b>■ Papelnet SIIC</b>	
		<b>Papel de los antipsicóticos atípicos en el tratamiento de sujetos con esquizofrenia y abuso de sustancias</b>	
		<i>La risperidona muestra mayor eficacia respecto del zuclopentixol en cuanto a la mejora de la sintomatología relacionada con el consumo de drogas y mejorar los síntomas de la esquizofrenia.</i>	194
		<b>Avaliação (Evaluación) dos resultados do tratamento cirúrgico (quirúrgico) de pacientes portadoras de endometriose infiltrativa profunda</b>	
		<i>Os avanços técnico-cirúrgicos e a melhora da curva de aprendizado fizeram da cirurgia laparoscópica um procedimento seguro e referência para o tratamento cirúrgico da EIP, com significativa diminuição dos sintomas dolorosos no pós-operatório.</i>	194
		<b>Valoración de la capacidad de ejercicio en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar</b>	
		<i>Revisión sobre el desempeño de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar y comparación de los resultados con la prueba de caminata de 6 minutos.</i>	194
		<b>Estudio prospectivo sobre factores de riesgo de infección nosocomial después de cirugía cardíaca pediátrica</b>	
		<i>La nutrición parenteral, un elevado puntaje de complejidad quirúrgica, la reintubación traqueal, el uso de antibioticoterapia preoperatoria y la transfusión masiva de hemoderivados fueron las variables asociadas a los más elevados riesgos de infección nosocomial.</i>	196
		<b>Experiencia de una unidad de hipertensión. Aportaciones útiles a la práctica clínica</b>	
		<i>Los beneficios del tratamiento antihipertensivo son inequívocos cuando éste es correcto, temprano y mantenido en el tiempo.</i>	196

	Página		Página
<b>Infección urinaria adquirida en la comunidad: etiología y resistencia de los uropatógenos más frecuentes</b>		en células endoteliales, lo que sugiere su uso en el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas como la aterosclerosis.	202
<i>Las tasas de resistencia y de resistencias cruzadas que que presenta Escherichia coli deben hacer reflexionar sobre cuáles serían los antibióticos más adecuados para su uso en el tratamiento empírico de las infecciones urinarias de vías bajas.</i>	196		
<b>Crónicas de autores</b>		<b>Contribuição da biomonitorização ambiental com líquenes para a avaliação da exposição humana às dioxinas</b>	
<b>Determinantes del consumo de verduras y frutas</b>		<i>A monitorização ambiental com líquenes permite seleccionar populações expostas e populações controlo em estudos de saúde pública. Os líquenes, simbioses entre fungos e algas, integram os poluentes ao longo do tempo, reflectindo a atmosfera a que os humanos e outros seres vivos estiveram expostos durante esse período.</i>	204
<i>El consumo de verduras y frutas en niños está determinado por su accesibilidad en el ámbito infantil, así como al parecer las niñas tienden a comer más vegetales que los varones.</i>	198		
<b>Iniciativa regional de escuelas promotoras de la salud en las Américas</b>		<b>Tumores no germinales inusuales del testículo</b>	
<i>Se describen experiencias locales exitosas de la región de las Américas, que reflejan cómo cada una está llevando la promoción de la salud hasta el interior de las escuelas. También presenta el desarrollo de redes y expone las perspectivas futuras para el fortalecimiento de la iniciativa regional y las escuelas promotoras de la salud.</i>	198	<i>A propósito de tres casos clínicos que incluyen el adenoma de la rete testis, el tumor indiferenciado de los cordones sexuales y el mesotelioma de la túnica vaginal, se realiza una revisión bibliográfica de los tumores inusuales del testículo y sus anexos, incluyendo su incidencia y manejo, señalando la importancia de la biopsia rápida en el caso de los tumores testiculares dado que, si ésta resultara benigna, podría realizarse una cirugía conservadora y evitar la necesidad de una orquiectomía radical.</i>	206
<b>La consistencia interna y la estructura factorial de una versión en castellano de la escala del Centro para Estudios Epidemiológicos de la Depresión</b>		<b>Casos clínicos</b>	
<i>La versión castellana de la escala CES-D mostró una adecuada consistencia interna (alfa de Cronbach = 0.89) y una estructura de cuatro factores: depresivo/somático, afecto positivo, actividad retardada y relaciones interpersonales. Los resultados también sugieren que la escala puede ser útil como instrumento de tamizaje, con un punto de corte de 26 (sensibilidad = 0.906; especificidad = 0.918) para la depresión mayor en poblaciones españolas no psiquiátricas.</i>	201	 <b>Consideraciones acerca de la anestesia de la intervención cesárea repetida en la parturienta con placentación anómala</b>	
<b>Prognóstico na insuficiência cardíaca descompensada: papel do NT-PROBNP</b>		<i>Si bien el diagnóstico de placenta acreta es raro, puede conducir a complicaciones potencialmente mortales y tiene consecuencias importantes en la conducta obstétrica y anestésica frente a estas mujeres. El obstetra y el anestesiólogo obstétrico deben saber cómo enfrentar este problema en el momento en el que se presenta.</i>	210
<i>Nos doentes internados por insuficiência cardíaca, o NT-proBNP na data de alta e a sua variação durante o internamento são factores de prognóstico independentes. Níveis séricos mais elevados e uma diminuição inferior a 30% associam-se a maior número de re-internamentos ou morte de causa cardiovascular, nos seis meses após a alta.</i>	201	<b>Colegas Informan</b>	214
<b>Efecto antiinflamatorio de la deshidroepiandrosterona en células endoteliales</b>		<b>Cartas a SIIC</b>	226
<i>La deshidroepiandrosterona inhibe in vitro algunos eventos involucrados en el proceso inflamatorio como la adhesión y el estrés oxidativo inducidos por el factor de necrosis tumoral alfa</i>		<b>Instrucciones para los autores</b>	228
		<b>Eventos auspiciados por SIIC</b>	236
		<b>Salud al Margen</b>	237

## Fe de Erratas

La foliación de Salud(i)Ciencia 16:1, por tratarse del primer número del volumen 16, debió comenzar en la página 1 y finalizar en la 116; en consecuencia, a partir de este número hemos corregido el error, la foliación comienza en la página 117, continuando la secuencia correcta del volumen.

	Page		Page
<b>SIIC's News</b>	131	<b>Continued increases in hospitalizations due to angioedema</b>	
■ <b>SIIC Informs</b>	132	<i>Angioedema is now the most common non-asthmatic acute allergic disorder, which results in hospitalization in New York State. The continued increases in angioedema hospitalizations may relate to greater use of ACE inhibitors.</i>	168
<b>Invited Experts</b>		<b>Antioxidant effect of a natural origin mixture with potential use in vitiligo</b>	
■ <b>Reviews</b>		<i>In summary, our results shown that the modification of melanocyte redox environment may explain, at least in part, the favorable clinical effects of this natural combination in vitiligo.</i>	173
<b>Antiplatelet treatment, diabetes mellitus and primary cardiovascular prevention. A critical appraisal of the American Diabetes Association statement</b>			
<i>This work is an updated revision of such evidence, on which the recommendations would have to be based.</i>	134		
<b>Omega-3 polyunsaturated fatty acids might be useful to prevent and treat depression in type 2 diabetes mellitus</b>		<b>Ambulatory surgery in proctology: retrospective analysis of 1 031 cases</b>	
<i>Supplementation with omega-3 PUFA, in particular eicosapentaenoic acid, may be a safe and helpful tool to reduce the incidence of depression and to treat depression in Type 2 diabetes. Further studies are now justified to test these hypotheses in patients with Type 2 diabetes.</i>	138	<i>The results obtained demonstrate that ambulatory procedures in proctology can be accomplished in a safe and systematic manner at low cost with advantages and fewer complications in relation to procedures completed in a hospitalization regime.</i>	177
			
<b>Usefulness of the electrocardiogram obtained by means of a central venous catheter in critically ill patients</b>		<i>The present study found support for an elevated risk of mortality from all-cause, cardiovascular disease, and CHD mortality in men with and without existing CHD. Becoming overweight or obese in middle-aged men should be avoided.</i>	183
<i>In this article, the author provides a description of the different existing electrocardiographic methods available to magnify the atrial electrical activity with special focus on the IC-ECG.</i>	146		
<b>Hormone replacement therapy and risk for neurodegenerative diseases</b>		<b>Interviews to Experts</b>	
<i>There are important limits to the existing research, but there are also persuasive reasons for reexamining how some forms of HRT may help preserve cognitive abilities in post-menopausal women and stave off neurodegenerative diseases.</i>	148	<b>Metabolic syndrome in adults from 20 to 40 years old in a rural Mexican community</b>	189
<b>Epidemiology and control of visceral leishmaniasis in Pernambuco, Brazil: current situation and perspectives</b>			
<i>It is also crucial to narrow the relationship between local public health managers and scientific community for the definition of research priorities and new strategies for the control of visceral leishmaniasis in Pernambuco.</i>	156	<b>SIIC Papelnets</b>	194
■ <b>Original Articles</b>		<b>Author's Chronicles</b>	198
<b>Neuroendocrine levels, circadian profiles, and sleep in night eating syndrome: integration of findings</b>		<b>Case Reports</b>	210
<i>The polysomnographic, neuroendocrine, and circadian rhythm analyses of dietary, hormonal, and sleep factors shed light on the underlying pathophysiology of NES and support the conceptualization of NES as a disorder of phase-delayed eating with other accompanying circadian hormonal changes.</i>	160	<b>Colleagues Inform</b>	214
		<b>Letters to SIIC</b>	226
<b>Anticoagulation in patients aged less than 75 years with atrial fibrillation</b>		<b>Guidelines for Authors</b>	228
<i>Oral anticoagulation in non-valvular atrial fibrillation following the recommendations of scientific societies is effective and safe in patients younger than 75 years in daily clinical practice.</i>	164	<b>Beyond Health</b>	237