

Noticias Propias

Editorial



La detección de las reacciones adversas a medicamentos debe y puede mejorarse

Página

498

en niños. Los probióticos pueden ser útiles, al aumentar la adhesión de los pacientes mediante la disminución de los efectos secundarios de los antibióticos.

Página

536

SIIC Informa

Expertos Invitados

Revisiones

Modulação da secreção do hormônio de crescimento pela ghrelina e secretagogos do hormônio de crescimento

No presente trabalho apresentamos uma revisão sobre a descoberta da ghrelina, os dados existentes sobre os mecanismos de ação e possível papel fisiológico dos secretagogos de hormônio de crescimento e da ghrelina na secreção de hormônio de crescimento e, finalmente, os efeitos da administração endovenosa destes peptídeos sobre a secreção de hormônio de crescimento no homem.

500

Efeito da alopregnanolona sobre o desenvolvimento da tolerância rápida ao efeito ansiolítico do etanol

Estudos prévios têm mostrado que o neuroesteróide isopregnanolona bloqueou o desenvolvimento da tolerância rápida ao efeito ansiolítico do etanol. O objetivo do presente estudo foi investigar a influência da alopregnanolona sobre o desenvolvimento da tolerância rápida ao efeito ansiolítico do etanol em camundongos.

539

Tratamiento de las complicaciones infecciosas de la nutrición parenteral domiciliaria

En los últimos años se ha popularizado la técnica del sellado del catéter con antimicrobianos, que parece mejorar las tasas de salvamento del catéter y disminuir las recaídas tras el tratamiento.

505

El tratamiento conservador parece la mejor opción para los aneurismas coronarios sin estenosis

La terapia farmacológica parece ser una buena alternativa para tratar los aneurismas coronarios sin estenosis asociadas, con buen pronóstico a mediano y largo plazo.

543

Ecoepidemiología de la leishmaniasis cutánea en la Argentina

Las características microfocales de la distribución del vector de *Leishmania braziliensis* deben guiar las estrategias de control o vigilancia de la leishmaniasis cutánea en la Argentina.

509

El impacto de la depresión sobre la medición de los síntomas negativos en la esquizofrenia

La depresión tiene un efecto diferencial sobre los síntomas negativos en la esquizofrenia; aumenta los síntomas negativos sociales en los sujetos con pocos síntomas negativos basales y tiene poco efecto o ninguno en los sujetos con síntomas negativos primarios graves.

548

Carcinomas renales poco frecuentes

En este artículo se revisa el conocimiento actual acerca de tres de estos tumores: carcinoma renal mucinoso tubular y de células fusiformes, carcinoma de células renales asociado a la translocación Xp11.2/gen de fusión TFE3 y carcinoma tubuloquistico.

514

Utilización de los estudios de reserva funcional renal en pediatría

Este artículo muestra el uso de los estudios de reserva funcional renal en un centro nefrológico infantil para identificar niños con daño renal que corren riesgo de padecer insuficiencia renal crónica en ausencia de anomalías de los electrolitos séricos o de la orina con índices de filtración glomerular mayores de 60 ml/min/1.73 m².

553

Originales

La asociación del calcio sérico con la resistencia a la insulina y la función de las células beta es dependiente del nivel de glucemia

En individuos normoglucémicos, el Ca⁺⁺ se relaciona con una menor función de las células beta y una mayor concentración de glucemia, mientras que en sujetos con hiperglucemia en ayunas y diabetes, se relaciona con la resistencia a la insulina.

521

Entrevistas a Expertos

Infecciones micóticas en pacientes con trasplante de médula ósea

Las infecciones fúngicas invasoras son un problema creciente en la mayor parte del mundo y la principal causa de muerte, particularmente en pacientes con enfermedades hematológicas y en receptores de trasplante de médula ósea.

564

Epidemiología y supervivencia del melanoma cutáneo en España: estudio de 879 casos (1991-2007)

La mayoría de los melanomas se encuentran en estadio I en el momento del diagnóstico (45%); sin embargo, una importante proporción de melanomas se diagnostica en estadios avanzados (III-IV; 14.5%).

525

Papelnet SIIC

Avances en el tratamiento antirretroviral para convertir la infección por VIH en una enfermedad crónica

Actualmente, el objetivo general es disminuir la CV por debajo de 50 copias/ml, avance importante en el tratamiento de la infección por VIH para convertirla en una infección crónica.

570

Avances en el tratamiento de *Helicobacter pylori* en pacientes pediátricos


En la actualidad, ninguna terapia presenta una tasa de erradicación del 100% de la infección por *Helicobacter pylori*. Un nuevo tratamiento secuencial de 10 días alcanzó una tasa de erradicación de 97%

530

La variación genética en el locus de la enzima convertidora se asocia con riesgo de nefropatía diabética

Se observó una disminución del riesgo de nefropatía diabética en personas con diabetes tipo 1 de raza blanca y asiáticos con diabetes tipo 2 asociada con el genotipo II del locus de la enzima convertidora de angiotensina.

570

	Página		Página
Tumores malignos de cavidad nasal y senos paranasales			
<i>Los tumores malignos de cavidad nasal y senos paranasales son infrecuentes, comprenden menos del 1% de todas las neoplasias malignas y representan el 3% de los tumores originados en cabeza y cuello.</i>	570		
Hipertensión en el embarazo: clasificación y fisiopatología			
<i>Existen cuatro trastornos hipertensivos principales que complican, aproximadamente, el 10% de todos los embarazos. La preeclampsia se clasifica en leve o grave; la eclampsia y el síndrome HELLP son variantes de la preeclampsia grave. La hipertensión crónica se presenta antes de las 20 semanas del embarazo. La preeclampsia superpuesta se diagnostica en mujeres con hipertensión crónica. La hipertensión gestacional es la hipertensión sin proteinuria.</i>	570		
Fraciones séricas específicas en pacientes pediátricos en estado crítico			
<i>Se analiza la concentración de fracciones específicas en 11 niños menores de 13 meses, internados en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos con diferentes enfermedades al ingreso y luego de recibir durante 7 días alimentación enteral.</i>	572		
Efectos adversos de los fármacos antirretrovirales. Fisiopatología, manifestaciones clínicas y tratamiento			
<i>El mejor conocimiento de los efectos adversos de los fármacos antirretrovirales es necesario para intentar optimizar el tratamiento en pacientes infectados por el VIH.</i>	572		
Los ancianos con neoplasias de cabeza y cuello no reciben el tratamiento adecuado			
<i>Los pacientes ancianos con cáncer de cabeza y cuello a menudo reciben un tratamiento subestándar por razones distintas de la comorbilidad. Sin embargo, el impacto del tratamiento sobre la calidad de vida es comparable a los pacientes más jóvenes. Por lo tanto, siempre hay que considerar el tratamiento estándar si no existen comorbilidades graves.</i>	572		
Crónicas de autores			
Transferência placentária de drogas			
<i>O obstetra deve estar atento à transferência placentária de drogas e à exposição do feto a agentes teratogênicos ou tóxicos, que podem comprometer o seu desenvolvimento. Muitas drogas lícitas e ilícitas acabam sendo usadas por pacientes durante o período gestacional, porém por motivos éticos e de segurança, apenas um limitado número de drogas são estudadas na gestação.</i>	574		
Aspectos prácticos derivados del estudio farmacocinético de microemulsión de ciclosporina en niños con trasplante hepático reciente			
<i>La inmunosupresión basada en ciclosporina (CsA) administrada por vía enteral desde el primer día postrasplante hepático presenta perfiles de eficacia y seguridad adecuados. Para evitar el uso adicional de ciclosporina intravenosa, estos resultados aconsejan</i>		<i>dosis de CsA de inicio superiores (20-25 mg/kg/día), en especial en aquellos niños en los que se realiza Y de Roux nueva. Los niveles CsA (C0 o C2) no son fiables como estimación de la exposición al fármaco en los primeros días postrasplante.</i>	576
		Formación proporcionada a los pacientes de diálisis peritoneal domiciliaria en España	
		<i>En la mayoría de los centros de España existe un plan de formación en diálisis peritoneal que puede capacitar a los pacientes o al cuidador informal para realizar el tratamiento de forma segura en su domicilio, proporcionarle los conocimientos básicos sobre la enfermedad y las actividades rutinarias para el tratamiento, poder solventar eventualidades y emergencias, así como mejorar su calidad de vida estando en diálisis. Sería interesante el diseño de un plan de formación conjunto para todos los profesionales dedicados a esta actividad en España.</i>	576
		Lesión de las vías biliares. Empleo adecuado de cirugía endoscópica y cirugía percutánea	
		<i>Se destaca el valor de la prevención de la lesión. Para la determinación adecuada del tratamiento multidisciplinario se empleó una calificación LIT que combina: localización de la lesión (L), tipo de lesión (I) y momento o tiempo del tratamiento (T).</i>	580
		La aminosidina no es efectiva para la leishmaniasis mucocutánea	
		<i>La aminosidina parenteral no es efectiva para el tratamiento de la leishmaniasis mucocutánea causada por L. (V.) braziliensis en Perú. La combinación de aminosidina parenteral con un antimonial pentavalente amerita su evaluación debido a que se requieren nuevos medicamentos o combinaciones de medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad altamente prevalente, desfigurante y difícil de tratar.</i>	582
		Casos clínicos	
		Tiroides ectópico lingual	
		<i>El tiroides lingual es la presencia anormal del tiroides en la línea media de la base de la lengua, entre la valécula y la epiglotis, en el foramen caecum, del que no se conoce su historia natural por ser una rareza. Debe sospecharse, ante una clínica inespecífica de irritación local, junto con pruebas de función tiroidea alterada.</i>	584
			
		Colegas Informan	588
		Cartas a SIIC	602
		Instrucciones para los autores	606
		Eventos auspiciados por SIIC	614
		Salud al Margen	615

SIIC's News

Editorial



Detection of adverse drug reactions should be and could be improved

SIIC Informs

Invited Experts


Reviews

Modulation of growth hormone secretion through the action of growth hormone secretagogues and ghrelin

In the current paper we review the available data on the discovery of this peptide, the mechanisms of action and possible physiological roles of growth hormone secretagogues and ghrelin on growth hormone secretion, and, finally, the regulation of growth hormone release in man after intravenous administration of these peptides.

Infectious complications of home parenteral nutrition

In recent years, antibiotic-lock therapy has been suggested for the treatment of these infections. This technique seems to improve the cure rate and to reduce the rate of relapse.



Eco-epidemiology of cutaneous leishmaniasis in Argentina

This article reviewed, from the eco-epidemiological point of view, the papers available about tegumentary leishmaniasis in Argentina since the first reported outbreak (1985-1987) including unpublished data.

Infrequent renal tumors

In this article, we describe the current knowledge on mucinous tubular and spindle renal cell carcinoma, renal cell carcinoma associated with Xp11.2 translocation/TFE3 gene fusion, and tubulocystic carcinoma.

Original Articles

Association of serum calcium with insulin resistance and beta-cell function is glucose level-dependent

The association between serum total Ca⁺⁺, insulin resistance and β-cell function is glucose level-dependent. In subjects with normal fasting glucose, Ca⁺⁺ is related to lower β-cell function and high glucose concentration, while in subjects with impaired fasting glucose plus diabetes, it is related to high insulin resistance.

Epidemiology and survival of cutaneous melanoma in Spain: a 879 cases report (1991-2007)

Most melanomas are in stage I at the moment of diagnosis (45%). Nevertheless, an important proportion of melanomas are still diagnosed in advanced stages (III-IV; 14.5%).

Advances in *Helicobacter pylori* treatment in children

*To day, no therapy leads to a 100% eradication rate of *Helicobacter pylori* infection. A novel 10 day sequential*

Page

498

treatment achieved an eradication rate of 97% in children. Probiotics could be useful to increase patient compliance reducing antibiotics side effects.

Page

536

500

Effect of allopregnanolone on development of rapid tolerance to the anxiolytic effect of ethanol

It has been shown that the neurosteroid isopregnanolone blocks the development of rapid tolerance to the anxiolytic effect of ethanol. The aim of the present study was to investigate the influence of allopregnanolone on the development of rapid tolerance to the anxiolytic effect of ethanol in mice.

539

Conservative treatment is apparently the best option in coronary aneurysms without associated stenosis

Medical treatment may be an excellent option for most of the patients, with a good prognosis in the middle-long term follow up.

543

505

The impact of depression on the measurement of negative symptoms in schizophrenia

Depression has a differential effect on negative symptoms in schizophrenia.

Depression increases social negative symptoms in subjects with few negative symptoms at baseline and has little or no effect in subjects with severe primary negative symptoms.

548

509

Role of renal functional reserve in pediatrics

This article illustrates the use of renal functional reserve studies in a Children's Kidney Center to identify children with renal damage who are at risk for chronic renal disease in the absence of serum electrolyte or urinary abnormalities who have glomerular filtration rates greater than 60 ml/min/1.73m².

553

514

Interviews to Experts

Mycotic infections among bone marrow transplant patients



564

521

SIIC Papelnet

570

Author's Chronicles

574

Case Reports

584

Colleagues Inform

588

Letters to SIIC

602

Guidelines for Authors

606

Beyond Health

615