

Novedades en Neurología

Novedades en Neurología resalta artículos publicados en el último trimestre en *siicsalud*, el sitio oficial de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC). Los conceptos que acompañan a los títulos derivan hacia los artículos completos que el lector podrá consultar copiando las direcciones de sus páginas o mediante el escaneo del correspondiente CRR (Código Respuesta Rápida)*.

Octubre




Clinical Therapeutics
38(4):874-888,
Abr 2016

Beneficios del Tratamiento con Armodafinilo en Pacientes con Apnea del Sueño

El tratamiento con armodafinilo mejoró significativamente el cuadro clínico asociado con la apnea obstructiva del sueño en pacientes con somnolencia excesiva. Estos beneficios tuvieron lugar sin importar la aplicación de terapia con presión continua positiva en la vía aérea.

Taipei Medical University-Shuang Ho Hospital, Taipei, Taiwán (República Nacionalista China)
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152159




Journal of Pain Research
15(9):405-416,
Jun 2016

Efectos de la Pregabalina en el Dolor Neuropático Secundario a Daño Medular

Como los trastornos del sueño son frecuentes en los pacientes con dolor neuropático, las mejoras funcionales más importantes en el tratamiento con pregabalina se asocian con el alivio más pronunciado del dolor; los beneficios son particularmente relevantes en la interferencia del dolor con el sueño.

Nueva York, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152577




Brain Research
1608:225-234,
May 2015

Utilidad del Levetiracetam en Presencia de Estado Epiléptico

El levetiracetam es un antiepileptico de segunda generación y amplio espectro de acción cuya administración puede ser de utilidad para evitar el edema cerebral y la epilepsia secundaria al estado epiléptico.

Tokushima Bunri University, Nishihama, Japón
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/148034



Journal of Affective Disorders
87-91,
Ago 2015

Armodafinilo en la Depresión por Trastorno Bipolar Tipo 1

En el presente trabajo en fase III se estudió la eficacia del armodafinilo como tratamiento adyuvante de la depresión bipolar tipo I aguda y se revisaron investigaciones previas sobre el tema. Su uso, en general, fue bien tolerado.

Stanford University, Stanford, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153269



siicsalud

Tratamiento con Armodafinilo en el Trastorno de Sueño por Turnos de Trabajo

El uso de 150 mg de armodafinilo mejora significativamente la alerta, el rendimiento de la conducción vehicular y la creatividad en individuos con diagnóstico de trastorno de sueño por turnos de trabajo, en comparación con placebo.

Henry Ford Health System, Detroit, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153264



Epilepsy Research
114:13-22,
Ago 2015

Levetiracetam por Vía Intravenosa en el Estado Epiléptico

El uso de levetiracetam por vía intravenosa es bien tolerado y eficaz para tratar el estado epiléptico focal y generalizado, con pocos efectos adversos y, en general leves, incluso en ancianos y en individuos que reciben otros fármacos.

Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turquía
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153260



* Uso del Código Respuesta Rápida (CRR)

Proceda de la siguiente manera:

- Enfoque la cámara de su teléfono móvil del tipo *Smartphone* (u otro dispositivo de mano con cámara y GPRS) al CRR impreso, obtenga una foto de él o simplemente aguarde unos segundos.
- El sistema lo llevará automáticamente a la página del artículo en www.siicsalud.com.