

Tabla 1- Resumen de los Ensayos en Condiciones de Participar (Análisis Económico) *

	Inmovilización con yeso aislada	Inmovilización con yeso más ultrasonido	Enclavado Endomedular no Fresado	Enclavado Endomedular Fresado
Tiempo de Unión	154 días ^f (n=34) ²² 175 días ^g (n=26) ³⁸ 128.2 días (n=33) ³⁹ 119 días (n=50) ⁴⁰	96 días ^c (n=33) ²²	105.7 días (n=44) ⁴² 147 días ^b (n=5) ⁴³ 159.6 días ^d (n=25) ⁴⁴ 133 días ^h (n=27) ³⁸ 110 días (n=29) ³⁹	196 days ^a (n=9) ⁴³ 107.8 days ^e (n=25) ⁴⁴ 99.4 days ^j (n=60) ⁴⁸
<i>Relevancia en Promedio</i>	139.6 días	96.0 días	124.3 días	110.9 días
Infección Profunda	1 (n=45) ¹⁹ 1 (n=26) ³⁸ 0 (n=33) ³⁹ 0 (n=50) ⁴⁰		0 (n=52) ⁴² 1 (n=63) ⁴⁵ 1 (n=27) ⁴⁶ 0 (n=25) ⁴⁴ 0 (n=29) ³⁹ 0 (n=5) ⁴³ 0 (n=27) ³⁸	0 (n=73) ⁴⁵ 1 (n=28) ⁴⁶ 0 (n=25) ⁴⁴ 0 (n=9) ⁴³
<i>Relevancia en Promedio</i>	1.3%	1.3%	0.9%	0.7%
Retardo de Consolidación o Pseudoartrosis	9 (n=29) ¹⁷ 18 (n=26) ³⁸ 6 (n=45) ⁴¹ 1 (n=33) ³⁹ 3 (n=50) ⁴⁰	2 (n=31) ¹⁷	7 (n=27) ³⁸ 7 (n=63) ⁴⁵ 0 (n=29) ³⁹ 5 (n=25) ⁴⁴ 0 (n=5) ⁴³	3 (n=73) ⁴⁵ 1 (n=9) ⁴³ 0 (n=25) ⁴⁴
<i>Relevancia en Promedio</i>	20.2%	6.4%	12.8%	3.7%
Consolidación viciosa	7 (n=26) ³⁸ 27 (n=33) ³⁹		2 (n=63) ⁴⁵ 4 (n=25) ⁴⁴ 2 (n=29) ³⁹ 1 (n=27) ³⁸ 1 (n=52) ⁴²	3 (n=73) ⁴⁵ 0 (n=25) ⁴⁴ 1 (n=60) ⁴⁸
<i>Relevancia en Promedio</i>	57.6%	57.6%	5.1%	2.5%
Duración de la Internación	8.1 días (n=33) ³⁹ 10 días (n=50) ⁴⁰		8.7 días (n=44) ⁴² 11.7 días (n=29) ³⁹	7 días ⁱ (n=60) ⁴⁸
<i>Relevancia en Promedio</i>	9.2 días	9.2 días	9.9 días	7 días
Trombosis Venosa Profunda	3 (n=26) ³⁸		2 (n=63) ⁴⁵ 0 (n=27) ³⁸	1 (n=73) ⁴⁵
<i>Relevancia en Promedio</i>	11.5%	11.5%	2.2%	1.4%
Síndrome Compartimental	1 (n=45) ⁴¹ 0 (n=26) ³⁸		0 (n=25) ⁴⁷ 3 (n=63) ⁴⁵ 3 (n=25) ⁴⁴	0 (n=24) ⁴⁷ 0 (n=73) ⁴⁵ 2 (n=25) ⁴⁴
<i>Relevancia en Promedio</i>	1.4%	1.4%	5.3%	1.6%
Fracaso de los Cerrojos			12 (n=63) ⁴⁵ 13 (n=25) ⁴⁴	6 (n=73) ⁴⁵ 1 (n=25) ⁴⁴ 3 (n=60) ⁴⁸
<i>Relevancia en Promedio</i>			28.4%	6.3%
Fracaso del Clavo			0 (n=63) ⁴⁵ 1 (n=25) ⁴⁴	1 (n=73) ⁴⁵ 0 (n=25) ⁴⁴
<i>Relevancia en Promedio</i>			1.1%	1.0%

^a 95% IC = 84 – 315 días; ^b 95% IC = 42 – 266 días; ^c Puntajes determinados desde los 77 a los 175 días; ^d Puntajes determinados desde los 84 a los 252 días; ^e 95% IC = 91.1 – 100.9 días; ^f 95% IC = 140.3 – 167.7 días; ^g 95% IC = 165.6 – 184.4 días; ^h 95% IC = 124.8 – 141.2 días; ⁱ Puntajes determinados desde los 4 a los 10 días; ^j Puntajes determinados desde los 70 a los 140 días.

Las flechas indican los casos en que la información faltante de los resultados obtenidos por un tratamiento con inmovilización con yeso más ultrasonido, fue estimada por los ensayos sobre el manejo de las fracturas con inmovilización con yeso aislada.