

Tabla 4. Tratamiento y evolución en 155 pacientes con enfermedad de Kawasaki reportados en México (1977 – 2010)

TRATAMIENTO-EVOLUCION	Vizcaíno A	González GN	Rodríguez HR	Frenkel SM	Sotelo CN	Quezada ChG	Del Ángel A	Coria LJ	Gil VM	Reporte Casos Aislados	TOTAL
Gamaglobulina 400g/kg/4 d	-	-	1	1	15	2	0	-	-	1	20(12.9%)
Gamaglobulina de 1 a 2g/kg/d/única	-	-	4	7	12	5	15	15	18	6	84(54%)
Re-Tratamiento con gamaglobulina	-	-	-	-	3	-	-	2	3	2	11(7%)
Aspirina 80-100mg/kg/día	13	11	10	-	28	11	15	15	22	11	143(92%)
Dipiridamol	6	3	-	-	3	-	-	-	12	6	30(19%)
Pentoxifilina	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	6 (3.8%)
Pulsos Metil prednisolona 30mg/kg/día/3días	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3 (1.9%)
Heparina Infusión	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4 (3%)
Prednisona	-	2	-	-	1	-	-	-	-	4	7 (4.5%)
Cirugía Revascularización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3 (1.9%)
Sin secuelas a 3 meses	10	13	10	8*	27	17	10	15	17	4	124 (80%)
Aneurisma gigante	2	1	-	-	1	-	-	-	3	4	11 (7%)
Infarto del miocardio	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6	8 (5%)
Muerte ruptura aneurisma	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.6%)
Muerte Infarto miocardio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2 (1.2%)